

形,长4—12厘米,宽2—5厘米,先端渐尖,基部常为微心形,上面干后绿色带黄,下面稍浅色,侧脉多而密,彼此相隔2—3毫米,水平开出,在上下两面均明显,离边缘1毫米处互相结合成边脉;叶柄极短,近无柄。聚伞花序顶生或腋生,长约2厘米,有花3—6朵,有时为单生;花梗极短;萼管棒状,长13毫米,上部宽4毫米,下部渐狭窄,萼齿浅波状;花瓣分离,圆形,直径2—3毫米,外面的较大,里面的较小;雄蕊多数,花药小,长0.7毫米;花盘浅盆状;花柱长约5毫米。果实棒状或长筒形。花期8—10月。

产广东海南岛南部。偶见于低海拔森林中。分布于越南。

本种叶形似黑嘴蒲桃 *S. bullockii* (Hance) Merr. et Perry, 但嫩枝有棱,叶薄,干后不变黑,侧脉水平开出,萼管棒形。

#### 14. 皱萼蒲桃(海南植物志)

*Syzygium rysopodum* Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 220. 1938; 海南植物志 2: 16. 1965.

乔木,高达20米;嫩枝强烈压扁,干后黑褐色。叶片革质,椭圆形,长4.5—9厘米,宽1.7—3.6厘米,先端短急尖,尖头略钝,基部楔形,上面黄绿色,发亮,下面浅绿色,两面均有明显的细腺点,侧脉相隔1.5—2.5毫米,在两面均不很明显,以75°开角斜向上,贴紧边缘处结合成边脉;叶柄长9—14毫米,干后皱褶。聚伞花序通常顶生,有时生于上部叶腋内,长达6厘米;有短花梗;萼管粗棒形,长10—12毫米,宽4毫米,干后皱缩,萼齿5,极短;雄蕊长1—4毫米;花柱长4—5毫米。果实梨形或椭圆形,长约1厘米,成熟时红色;种子1—2颗。花期两次,3月及6—7月。

广东海南岛特有。偶见于南部中海拔山地森林中。

#### 15. 纤枝蒲桃(海南植物志)

*Syzygium stenocladum* Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 220. 1938; 海南植物志 2: 16. 1965.

乔木,高16米;嫩枝纤细,圆形,干后灰白色。叶片革质,狭椭圆形或狭长圆形,长4—7厘米,宽1.5—3厘米,先端渐尖,尖头略钝,基部变狭窄而下延,上面干后橄榄绿色,下面同色,两面均有细小腺点,侧脉多而密,脉间相隔1—2毫米,在上面不明显,在下面稍突起,以40°开角斜向上,在离边缘0.5毫米处结合成边脉;叶柄长4—8毫米。聚伞花序顶生或腋生,有花数朵;花梗短或无;萼管棒状,长1—1.2厘米,干后有直沟,萼齿浅波状;雄蕊长1—4毫米;花柱长4毫米。果实未成熟时长棒形。

广东海南岛特有。分布于西部的低海拔山地常绿林中,不常见。

这个种和子凌蒲桃 *S. championii* (Benth.) Merr. et Perry 十分接近,只是后者的枝有4棱,侧脉平缓,萼管较短。

#### 16. 短棒蒲桃

*Syzygium baviense* (Gagnep.) Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: