

102. 1938—*Eugenia baviensis* Gagnep. in *Lecte. Not. Syst.* 3: 317. 1917 et in *Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine* 2: 806. 1920.

灌木或小乔木；嫩枝圆形，干后灰白色。叶片薄，干后近纸质，长圆形或椭圆形，长9—15厘米，宽3.5—5厘米，先端锐尖，基部阔楔形，上面暗晦，下面无毛，侧脉14—19对，脉间相隔6—8毫米，以75°交角缓斜向边缘，脉间常有小脉与第一次侧脉相平行，边脉离边缘3—4毫米；叶柄长5—6毫米。伞房花序腋生，长1.5—2厘米，有花4—9朵，总梗长5毫米；花梗长3—4毫米，花蕾长1—1.2厘米，萼管短棒状，长6—8毫米，基部狭窄；萼片4，短三角形，长1毫米；花瓣连合；雄蕊长3—4毫米；花柱长3毫米。果棒形或长卵形，长1厘米，宽5毫米。

产云南河口一带。常见于海拔200米以下低地雨林中。分布于越南北部。

17. 纤花蒲桃 图版13: 4

Syzygium leptanthum (Wight) Nied. in Engl. u. Prantl *Nat. Pflanzenfam.* 3 (7): 85. 1893—*Eugenia leptanthum* Wight *Ill.* 2: 15. 1841; Duthie in Hook. f. *Fl. Brit. India* 2: 484. 1879; Gagnep. in *Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine* 2: 833. 1921, non Benth. (1840)

乔木，高11米；嫩枝圆形，稍压扁，干后灰白色。叶片薄革质，长圆形，长8—13厘米，宽3—4.5厘米，先端略尖或渐尖而钝头，基部阔楔形，上面干后黄绿色，多下陷小腺点，下面较淡，侧脉多而密，脉间相隔1—2毫米，缓斜向边缘，边脉离边缘约1毫米；叶柄长5—8毫米。聚伞花序腋生，长2.5厘米，有花5—9朵；花梗长2—3毫米；萼管棒状，长8—9毫米，下部狭长，上部扩大，萼齿浅波状；花瓣4，分离，卵形略圆，长3毫米；雄蕊比花瓣略长。

产云南思茅和广东海南岛昌江。分布于锡金至澳大利亚昆士兰。

这个种近似棒花蒲桃 *S. claviflorum* (Roxb.) Wall., 但叶片较短小，侧脉较密；花序腋生；萼管较短小。

18. 棒花蒲桃(海南植物志) 图版13: 1—2

Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall. *Cat. n.* 3575. 1831, nom. nud.; Cowan & Cowan, *Trees North. Bengal* 67. 1929; Merr. et Perry in *Journ. Arn. Arb.* 19: 221. 1938; 海南植物志 2: 16. 1965—*Eugenia claviflora* Roxb. *Hort. Bengal* 37. 1814 et *Fl. Ind. ed.* 2, 2: 488. 1832; Duthie in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* 2: 484. 1879; Merr. et Chun in *Sunyatsenia* 2: 43. 1934.

灌木至小乔木；小枝圆形，干后灰褐色。叶片薄革质，狭长圆形至椭圆形，长12—21厘米，宽4—8厘米，先端略尖或钝，基部阔楔形或略钝，上面干后绿色，稍发亮，下面浅绿色，侧脉18—25对，在下面稍突出，脉间相隔5—7毫米，网脉明显，边脉离边缘1—1.5毫米；叶柄长5—7毫米，干后皱缩。聚伞花序或伞形花序腋生及生于无叶老枝上，有花



1—2. 棒花蒲桃 *Syzygium claviflorum* (Roxb.) Wall.: 1. 小枝, 2. 花序。3. 子凌蒲桃 *S. champii* (Benth.) Merr. et Perry: 花枝及花。4. 纤花蒲桃 *S. leptanthum* (Wight) Nied.: 果枝 (果未成熟)。(冯钟元、邓晶发绘)