

3—9 朵,总梗长 3—5 毫米;花白色,花梗长 2 毫米,与萼管相接;萼管长约 1.5 厘米,棒状,表面有多数浅直沟,先端稍扩大,萼齿短,短半圆形;花瓣圆形,长 3 毫米;雄蕊长 4—7 毫米;花柱长 1.5—2 厘米,先端尖。果实长椭圆形或长壶形,长 1.5—2 厘米,宽 6—8 毫米。花期 4 月。

产广东海南岛。见于南部平地常绿林里。分布于马来西亚、印度、缅甸、泰国、越南等地。

系 2. 香胶蒲桃系——Ser. *Balsamea* Chang et Miau in Act. Bot. Yunnan. 4 (1): 18. 1982.

圆锥花序多枝丛出;花蕾倒圆锥形;果实球形或椭圆形;叶脉疏远。

有 7 种。

### 19. 毛脉蒲桃

*Syzygium vestitum* Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 110. 1938.

小乔木,高 4—7 米;嫩枝圆形,被毛。叶片革质,椭圆形,长 12—22 厘米,宽 4—7 厘米,先端急短尖,基部阔楔形,上面干后黑色,下面褐色,有细腺点,中脉及侧脉上有柔毛,侧脉约 10 对,相隔 1—1.5 厘米,侧脉之间有平行小脉,强直,共组成侧脉 20 条,边脉离边缘 5—6 毫米;叶柄长 7—9 毫米。圆锥花序顶生,长 10—14 厘米,多分枝,花序轴压扁,被红褐色具腺绵毛;花蕾无柄,长倒锥形,长 4—5 毫米,上部宽 2—3 毫米;萼管有微毛,萼片长约 1 毫米,圆形;花瓣分离;花药有腺状小突起。蒴果球形,直径 1—1.2 厘米。花期 5—7 月。

产云南东南部低山常绿林里。分布于越南的南部及北部,在越南南到达海拔 1500 米的沟谷。

### 20. 钝叶蒲桃 图版 14: 1

*Syzygium cinereum* Wall. Cat. n. 3576. 1831, nom. nud.; Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 106. 1938——*Eugenia cinerea* Kurz Prel. Rep. Pegu. App. A: 64, App. B: 50. 1875 et in Journ. As. Soc. Bengal 46: 66. 1877——*E. brachiata* auct. non Roxb.; Duthie in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 496. 1879; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 811. 1920.

小乔木,高 8 米;嫩枝圆形,干后灰色。叶片革质,倒卵形,长 7—10 厘米,宽 3—4.5 厘米,先端圆或钝,基部变狭窄,上面干后灰褐色,无光泽,下面带褐色,侧脉 7—9 对,脉间相隔 6—9 毫米,以 45° 开角斜向上,离边缘 2.5 毫米处相结合成边脉,在上面稍下陷,在下面突起,网脉不明显;叶柄长 5—8 毫米。圆锥花序顶生,长 3—7 厘米;花无梗;花蕾倒圆锥形,萼管长 3.5 毫米;萼齿 4,浅波状;花瓣 4,卵形略圆,长 2 毫米;雄蕊长约 1.5—2 毫米,花药细小;花柱长 1 毫米。果实球形,宽 6—8 毫米,熟时红色。花期 4—5 月。