

产广西钦县及防城一带。生于丘陵灌丛中。分布于中南半岛、马来西亚。

21. 云南蒲桃

Syzygium yunnanense Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 227. 1938.

乔木，高15米；嫩枝压扁，有浅槽，干后灰白色。叶片革质，阔披针形至椭圆形，长10—21厘米，宽3—7厘米，先端渐尖，基部阔楔形，上面干后褐绿色，无光泽，有多数微小腺点，下面与上面同色，多腺点，侧脉10—13对，以45°开角斜向上，离边缘3毫米处互相结合并形成边脉，侧脉间相隔8—13毫米，网脉明显；叶柄长1—1.5厘米。圆锥花序顶生，有时生于无叶老枝上，常2—4枝丛生，长3—6厘米，总梗长2—4厘米，圆形，褐色；花无梗，1—3朵簇生；萼管倒圆锥形，长2.5毫米，上部扩大，萼齿不明显；花瓣分离，近圆形，长3毫米；雄蕊极短，长1—1.5毫米，花药干后灰白色；花柱长2毫米。未成熟果实球形。花期5月。

产云南西双版纳一带。生于中海拔森林里。本种近似香胶蒲桃 *S. balsameum* Wall., 但花序顶生，花无柄。

22. 四角蒲桃 图版14: 2

Syzygium tetragonum Wall. Cat. n. 3550. 1831, nom. nud.; Walp. Reperert. 2: 179. 1843, descr.—*Eugenia tetragona* Wight Ill. 2: 16. 1841; Duthie in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 497. 1879—*S. nienkui* Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 228. 1938; 海南植物志 2: 19. 1965.

乔木，高20米；嫩枝粗大，四角形，有明显的棱。叶片革质，椭圆形或倒卵形，长12—18厘米，宽6—8厘米，先端圆或钝，而有一个长约1厘米的尖头，基部阔楔形或圆形，上面干后暗褐色，无光泽，下面稍淡，侧脉9—13对，脉间相隔7—10毫米，边脉离边缘2—3毫米，网脉明显；叶柄长1—1.6厘米，粗壮。聚伞花序组成圆锥花序，生于无叶的枝上，长3—5厘米；花无梗；花蕾长6—7毫米；萼管短，倒圆锥形，萼齿钝而短；花瓣连合成帽状；雄蕊长3毫米。果实球形，直径约1厘米。花期7—8月。

产广东海南岛、广西、云南等地。见于中海拔山谷或溪边。分布于锡金、不丹及印度。

Merrill 把海南标本定为 *S. nienkui* Merr. et Perry, 认为它和本种的区别在于枝条有明显的棱角，花也较大。其实产于喜马拉雅山区的标本都有明显的棱角。

23. 粗叶木蒲桃 图版15

Syzygium lasianthifolium Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4 (1): 18. 1982.

灌木，高2米；嫩枝四棱形，干后暗褐色，老枝灰白色。叶片革质，长圆形，长6—10厘米，宽2—3.5厘米，先端急尖或渐尖，基部阔楔形或钝，上面干后黑褐色，发亮，下面红褐色，侧脉7—9对，脉间相隔6—10毫米，边脉离边缘2—3毫米，外侧另有1条小边脉；叶



1. 钝叶蒲桃 *Syzygium cinereum* Wall.: 果枝。 2. 四角蒲桃 *S. tetragonum* Wall.: 果枝。
(冯钟元、邓晶发绘)