

柄长5—7毫米。聚伞花序腋生，长1—2厘米。果实椭圆形，长1厘米，宽6—7毫米，成熟时紫色，宿存萼齿4，半圆形，长1.5毫米，宿存花柱长3毫米，稍突出环形的萼檐外。果期5—6月。

分布于广东廉江一带。

这是一个特征明显又是比较特殊的种，枝条有显著的棱角。在具有稀疏侧脉的香胶蒲桃系 *Ser. Balsameae* 里，它的叶片最小，圆锥花序生于当年枝的叶腋，都和本系其余5种有明显的区别。

24. 香胶蒲桃

Syzygium balsameum Wall. Cat. n. 3592. 1831, nom. nud.; Walp. Repert. 2: 179. 1843, descr.; Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 108, 229. 1938—*Eugenia balsameum* Wight Ill. 2: 16. 1841; Duthie in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 499. 1879; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 819. 1920.

灌木或小乔木，高达12米；嫩枝稍压扁，干后灰白色。叶片革质，椭圆形或狭长圆形，长10—20厘米，宽4—8.5厘米，先端尖，有时略钝，基部阔楔形，上面干后浅褐色，无光泽，多微细油腺点，下面灰褐色，腺点明显，侧脉11—13对，在下面突起，脉间相隔8—13毫米，网脉明显，边脉离边缘约2.5毫米；叶柄长1—1.3厘米。圆锥花序腋生及生于无叶老枝上，长2—7厘米，花序轴灰白色；花有短梗；萼管倒圆锥形，长2.5毫米，先端近于平截，萼齿不明显；花瓣连合成帽状；雄蕊长2—3毫米；花柱约与雄蕊等长。果实球形，直径5—6毫米；种子1颗。花期12月。

产云南西双版纳一带潮湿森林及河边。分布于锡金、中南半岛。

25. 西藏蒲桃

Syzygium xizangense Chang et Miao, 西藏植物志 3, 1985.

乔木，高达25米；嫩枝圆形，无毛，干后灰褐色。叶片薄，纸质，长圆形或椭圆形，长8—23厘米，宽3.5—6.2厘米，先端渐尖，有时短急尖，基部阔楔形，上面干后深绿色，稍发亮，下面浅绿色，无毛，两面均有明显细腺点，侧脉9—10对，彼此相隔8—16毫米，以75°交角走向边缘，侧脉间有第二次平行支脉，边脉离边缘2—5毫米；叶柄长7—13毫米。聚伞花序生于无叶老枝上，长2—6厘米，有花4—7朵，总梗长1厘米；花梗长4—8毫米，二者均有疏毛；花蕾倒卵形，长6—7毫米；萼管长4—5毫米，有微毛，萼齿4，半圆形，长1.5—2毫米；花瓣4，倒卵形，长5—6毫米，白色；雄蕊长6—10毫米；花柱长4—5毫米。

产西藏墨脱一带，海拔800—1000米，阔叶林中。

系3. 高檐蒲桃系——*Ser. Oblata* Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 18. 1982.

圆锥花序单生，顶生或腋生；叶脉密致。

有 48 种。

26. 尖萼蒲桃

Syzygium acutisepalum (Hayata) Mori in Trans. Nat. Hist. Soc. Form. 28: 483. 1938; H. L. Li Woody Fl. Taiwan 649. 1963——*Eugenia acutisepala* Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30: 112. 1911.

灌木;嫩枝四棱形,有灰色柔毛。叶片革质,长圆形,长 4.5 厘米,宽 1.5—2 厘米或稍大,先端钝,基部楔形,上面干后褐色,发亮,下面灰褐色,侧脉纤细,几与中脉垂直,靠近边缘结合成边脉;叶柄长 8 毫米。聚伞花序顶生及生于枝顶叶腋,长 3 厘米,三次分枝;花梗长 3 毫米;苞片针状,小苞片 2,长 1 毫米,位于萼管基部;萼管倒圆锥形,长 4 毫米,宽 3 毫米,基部狭窄,萼齿 4,细小三角形,长不及 1 毫米;花瓣 4,近圆形,长 2 毫米,多少连合成帽状;雄蕊约 25 枚,花丝长 3 毫米,花药短小;花柱单一,长 4 毫米,子房 2 室。

产我国台湾的台北、台东及恒春等地。

这个种和华南蒲桃 *S. austrosinense* Chang et Miao 很接近,只是嫩枝有毛,叶片稍狭窄。

27. 怒江蒲桃 图版 16: 1

Syzygium salwinense Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 237. 1938.

乔木,高 3—15 米;嫩枝四角形,有时有槽,干后灰色。叶片革质,狭长圆形,长 4—8 厘米,宽 1.2—3.5 厘米,先端渐尖而有钝的尖头,基部楔形,上面干后橄榄黄色,下面较浅色,两面均有腺点,中脉下陷,侧脉约 25 对,干后下陷,在贴近边缘 2 毫米处结合成边脉;叶柄长 3—10 毫米。圆锥花序腋生,或生枝顶叶腋,长 2—4 厘米,常有叶片;无花梗,常 3 朵花簇生于花枝末端;花蕾长约 5 毫米,上部宽约 3 毫米;萼管梨形,萼齿长 0.5 毫米,宽 1.5 毫米;花瓣连合;雄蕊长约 5 毫米,花药长 0.5 毫米,顶端有腺状突起。果实球状壶形,直径约 1 厘米。

产云南西北部、怒江流域一带,也见于广西。

这个种很接近 *S. nigrans* (Gagnep.) Chang et Miao (*Eugenia nigrans* Gagnep. in Lecte., Not. Syst. 3: 329. 1914), 只是后者的叶片稍大,花瓣 5,连成帽状,果也较大。

28. 硬叶蒲桃(海南植物志) 图版 16: 2

Syzygium sterrophyllum Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 103, 232. 1938; 海南植物志 2: 19. 1965——*Eugenia fluviatilis* auct. non Hemsl.; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 810. 1920.

灌木至小乔木,高 1—5 米;嫩枝有四棱,干后暗褐色。叶片革质,狭披针形,长 6—13 厘米,宽 1—1.8 厘米,先端渐尖,基部狭楔形,下延,上面干后灰褐色,不发亮,下面褐绿色,侧脉多而密,彼此相隔 1—1.5 毫米,急斜向上,靠近边缘 0.5 毫米处相结合成边脉,