

在上面不明显,在下面稍突起;叶柄长3—6毫米。聚伞花序腋生或生枝顶叶腋,长1—1.5厘米,有花数朵;花白色,无花梗或有短梗;花蕾长4.5毫米;萼管倒圆锥形,长3毫米,萼齿不明显;花瓣连合成帽状;雄蕊长3—4毫米;花柱约与雄蕊等长。果实椭圆形,长7—8毫米,宽5—6毫米,顶部冠以长1—1.5毫米的宿存萼檐。花期6—9月。

产广东、广西等省区。生山谷或河边。分布于越南。

29. 滇边蒲桃

Syzygium forrestii Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 238. 1938.

乔木,高10米;嫩枝压扁或略有棱,粗约2毫米,干后黑褐色。叶片革质,椭圆形,长6—11厘米,宽2.5—4厘米,两端狭窄,先端渐尖,尖尾长1—2.5厘米而有一钝头,基部楔形,上面有稀疏腺点,侧脉多而密,在下面略突起,离边缘0.5—1毫米处结合成边脉;叶柄长12—18毫米。圆锥花序腋生或生于枝顶叶腋,多花,长3—8厘米,次级花序轴长0.5—3厘米;花蕾近于无柄,长5毫米,先端球形,宽3.5毫米,急剧收缩成极短而厚的柄;萼齿不明显;花瓣连成帽状或分离;雄蕊长6毫米,花药椭圆形,长0.6毫米,顶端有腺状突起。果实椭圆状卵形,长约8毫米,宽6毫米。

产云南西部怒江流域到西双版纳一带。

30. 方枝蒲桃(海南植物志) 图版16: 3—5

Syzygium tephrodes (Hance) Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 223. 1938; 海南植物志 2: 16. 1965——*Eugenia tephrodes* Hance in Journ. Bot. 23: 7. 1885; Forbes & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 298. 1887; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 137. 1927.

灌木至小乔木,高达6米;小枝有4棱,干后灰白色,老枝圆形,灰褐色。叶片革质,近于无柄,细小,卵状披针形,长2—5厘米,宽1—1.5厘米,先端钝而渐尖,或钝而略尖,基部微心形,上面干后灰绿色或灰褐色,无光泽,下面稍浅,侧脉12—16对,在上面明显,在下面隐约可见,近于水平斜出,边脉极靠近边缘,侧脉间相隔约1.5毫米。圆锥花序顶生,长3—4厘米,总梗有棱,灰白色;花梗长1—2毫米,花白色,有香气;萼管窄倒圆锥形,长约4毫米,灰白色,干后纵向皱褶,萼齿4,近圆形,长约1毫米;花瓣连合,圆形,长2毫米;雄蕊长3—4毫米;花柱长6—7毫米。果实卵圆形,长3—4毫米,灰白色,上部较狭,顶部有宿存萼齿。花期5—6月。

广东海南岛特有。常见于低海拔森林里。

31. 广西蒲桃 图版17: 1

Syzygium guangxiense Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 22. 1982.

灌木,高1米;嫩枝扁而有棱,干后灰褐色,老枝灰色。叶片薄革质,长椭圆形,长8—12厘米,宽3—5厘米,先端急短尖,尖头长不到1厘米,基部阔楔形或钝,上面干后灰褐



1. 怒江蒲桃 *Syzygium salwinense* Merr. et Perry: 花枝。2. 硬叶蒲桃 *S. sterrophyllum* Merr. et Perry: 果枝。3—5. 方枝蒲桃 *S. tephrodes* (Hance) Merr. et Perry: 3. 果枝, 4. 花萼, 5. 雄蕊。(冯钟元, 邓晶发绘)