

36. 轮叶蒲桃 图版 17: 2

Syzygium grijsii (Hance) Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 233. 1938——*Eugenia grijsii* Hance in Journ. Bot. 9: 5. 1871——*E. pyriphylla* Hance, l. c. 6. 1871.

灌木,高不及1.5米;嫩枝纤细,有4棱,干后黑褐色。叶片革质,细小,常3叶轮生,狭窄长圆形或狭披针形,长1.5—2厘米,宽5—7毫米,先端钝或略尖,基部楔形,上面干后暗褐色,无光泽,下面稍浅色,多腺点,侧脉密,以 50° 开角斜行,彼此相隔1—1.5毫米,在下面比上面明显,边脉极接近边缘;叶柄长1—2毫米。聚伞花序顶生,长1—1.5厘米,少花;花梗长3—4毫米,花白色;萼管长2毫米,萼齿极短;花瓣4,分离,近圆形,长约2毫米;雄蕊长约5毫米;花柱与雄蕊同长。果实球形,直径4—5毫米。花期5—6月。

产浙江、江西、福建、广东、广西。

本种近似赤楠 *S. buxifolium* Hook. & Arn., 但叶细小而狭长,常3叶轮生。

37. 倒披针叶蒲桃 图版 17: 3

Syzygium oblancilimbium Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4 (1): 23. 1982.

矮小灌木,高0.6米,多分枝;嫩枝有棱,干后灰褐色。叶片革质,短小,倒披针形,长2.2—3厘米,宽7—10毫米,先端圆形或钝,基部变狭窄,楔形,上面干后灰褐色,不发亮,有多数下陷腺点,下面稍浅色,侧脉相隔1—1.5毫米,以 45° 开角斜向上,在上面下陷,在下面不明显,边脉极靠近边缘;叶柄长1毫米。聚伞花序顶生,长1厘米,有花数朵;花梗1—2毫米。果实球形,直径4毫米,上部有长约1—1.5毫米的萼檐,萼齿短三角形,长0.5毫米。果期9月。

产云南西部双江。海拔750米的河边沙地。

这个种近似轮叶蒲桃 *S. grijsii* (Hance) Merr. et Perry, 但叶较大,倒披针形,先端圆形,叶面多下陷腺点,背脉不明显,花柄较短。

38. 四川蒲桃

Syzygium szechuanense Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4 (1): 21. 1982.

小乔木;嫩枝有棱,无毛,干后黑褐色。叶片革质,卵状披针形,长6—9厘米,宽2—2.5厘米,先端尾状渐尖,尾长1.5—2厘米,基部楔形,下延,上面干后黑褐色,不发亮,下面黄褐色,多突起的黑腺点,侧脉密,相隔1—2毫米,以 60° 交角斜行,边脉离边缘1毫米与侧脉在上面不明显,在下面能见;叶柄长约5毫米。花顶生,单花或2—3朵排成聚伞花序,长1厘米,总梗长5毫米;苞片针形,长1毫米;花梗长2—3毫米,无毛;萼管倒圆锥形,长3毫米,无毛,萼齿4,短而钝;花瓣长2毫米,雄蕊长4—5毫米;花柱与雄蕊等长。

产四川(北碚?)。

这个种近似贵州蒲桃 *S. handelii* Merr. et Perry, 但后者叶片披针形,宽1—1.8



1. 广西蒲桃 *Syzygium guangxiense* Chang et Miao: 果枝。2. 轮叶蒲桃 *S. grijsii* (Hance) Merr. et Perry: 果枝。3. 倒披针叶蒲桃 *S. oblancilimbum* Chang et Miao: 果枝。(冯钟元、邓品发绘)