

不明显,在下面稍突起;叶柄长3—5毫米。圆锥花序顶生或近顶生,长约1.5厘米,有花3—9朵,总梗长约2—5毫米;花梗短,长约2毫米或无花梗;花蕾倒卵形,长3.5毫米;萼齿不明显;花瓣分离,长3毫米;雄蕊长4毫米。果实椭圆状卵形,长1—1.5厘米,宽8—10毫米,成熟时紫色;种子1个,多胚。花期7—8月。

产广西至云南西双版纳一带。生于中海拔的荒山或山顶疏林里。

42. 华南蒲桃 图版 19: 1

Syzygium austrosinense (Merr. et Perry) Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 24. 1982.——*S. buxifolium* Hook. et Arn. var. *austrosinense* Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 236. 1938.

灌木至小乔木,高达10米;嫩枝有4棱,干后褐色。叶片革质,椭圆形,长4—7厘米,宽2—3厘米,先端尖锐或稍钝,基部阔楔形,上面干后绿褐色,有腺点,下面同色,腺点突起,侧脉相隔1.5—2毫米,以70°开角斜出,在上面不明显,在下面稍明显,边脉离边缘不到1毫米;叶柄长3—5毫米。聚伞花序顶生,或近顶生,长1.5—2.5厘米;花梗长2—5毫米;花蕾倒卵形,长4毫米;萼管倒圆锥形,长2.5—3毫米,萼片4,短三角形;花瓣分离,倒卵圆形,长2.5毫米;雄蕊长3—4毫米;花柱长3—4毫米。果实球形,宽6—7毫米。花期6—8月。

产四川、湖北、贵州、江西、浙江、福建、广东、广西等省区。生于中海拔常绿林里。

本种和赤楠 *S. buxifolium* Hook. et Arn. 的区别在于叶片较大,花柄较长,萼齿较尖。

43. 恒春蒲桃

Syzygium kusukusense (Hayata) Mori in Trans. Nat. Hist. Soc. Form. 28: 504. 1938; H. L. Li Woody Fl. Taiwan 650. 1963——*Eugenia kusukusensis* Hayata Icon. Pl. Form. 3: 119. 1913.

小乔木;嫩枝圆形。叶片革质,长圆形或卵状披针形,长9—14厘米,宽约4厘米,先端渐尖,基部楔形,两面有腺点,干后叶面暗褐色,有光泽,侧脉多数,密而平行,在两面均明显,平缓斜向上,在靠近边缘相结合成边脉,脉间相隔2—3毫米;叶柄长1—2厘米。圆锥花序顶生,多分枝,长4厘米,宽6厘米;花梗长2毫米;萼管长3—5毫米,倒圆锥形,萼齿不明显;花瓣连合成帽状,整块脱落;雄蕊极短,长约1.5毫米。果实球形,直径约2厘米。

产我国台湾省恒春。

44. 香蒲桃 (海南植物志) 图版 19: 2—4

Syzygium odoratum (Lour.) DC. Prodr. 3: 260. 1828; Hook. & Arn. Bot. Beechey, Voy. 187. 1833; Benth. Fl. Hongk. 119. 1861; Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 102. 225. 1938; 海南植物志 2: 17. 1965——*Opa odorata* Lour. Fl. Cochich. 309. 1790; Moore in Journ. Bot. 63: 283. 1925; non *Eugenia odo-*