

卵圆形或壶形,长1—2厘米,上部有长1—1.5毫米的宿存萼筒;种子1颗。花期2—3月。

产台湾、福建、广东、广西、云南等省区。常见于平地次生林及荒地上。分布于中南半岛、马来西亚、印度、印度尼西亚、澳大利亚等地。

52b. 长萼乌墨 (变种) 图版 22: 2—3

var. *tsoi* (Merr. et Chun) Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 22. 1982. — *Eugenia tsoi* Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 291. 1935.

花无花梗;萼管长梨形,长7—8毫米;其余特征和原变种一致。原变种的花有短梗,萼管倒圆锥形,长3—4毫米,与本变种容易区分。

产广东、广西。

53. 簇花蒲桃 图版 24

*Syzygium fruticosum* (Roxb.) DC. Prodr. 3: 260. 1828 et Mém. Myrt. t. 19. 1842; Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 109, 231. 1938 — *Eugenia fruticosa* Roxb. Fl. Ind. ed. 2, 2: 487. 1832; Wight Icon. 2: t. 624. 1843; Kurz in Journ. As. Soc. Bengal 46(2): 66. 1877 et For. Fl. Brit. Burma 1: 485. 1877; Duthie in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 499. 1879; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 843. 1921.

乔木,高12米;嫩枝压扁或有槽,干后暗褐色,老枝灰白色。叶片薄革质,狭椭圆形至椭圆形,长9—13厘米,宽3.5—5.5厘米,先端渐尖,基部阔楔形或略圆,上面干后褐色,发亮,多腺点,下面红褐色,多腺点,侧脉多而密,相隔2—3毫米,缓斜向边,靠近边缘1毫米处结合成边脉;叶柄长1—1.5厘米。圆锥花序生于无叶老枝上,长4—7厘米;花无梗,5—7朵簇生第三级花序柄上;萼管倒圆锥形,长2—2.5毫米,萼齿不明显;花瓣4,分离,圆形,宽1—1.5毫米;雄蕊长1.5—2.5毫米;花柱与雄蕊等长。果实球形,直径6毫米,熟时红色;种子1颗。花期5月。

产广西、贵州、云南河口至西双版纳一带。常见于低海拔疏林或荒地上。分布于中南半岛、缅甸、印度等地。

54. 水竹蒲桃 (海南植物志) 图版 23: 2

*Syzygium fluviatile* (Hemsl.) Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 241. 1938; 海南植物志 2: 21. 1965. — *Eugenia fluviatilis* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 296. 1887; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 136. 1927.

灌木,高1—3米;嫩枝圆形,干后褐色。叶片革质,线状披针形,长3—8厘米,宽7—14毫米,先端钝或略圆,基部渐变狭窄,上面干后暗褐色,不发亮,有多数下陷腺点,下面黄褐色,多突起小腺点,侧脉多而密,彼此相隔1.5—2毫米,以40°角急斜向上,离边缘约0.3毫米处结合成边脉,在上面不明显,在下面略突起;叶柄极短,长约2毫米。聚伞花序腋生,长1—2厘米,花蕾倒卵形,长4毫米;花梗长2—3毫米,有时无柄;萼管倒圆锥形,



皱花蒲桃 *Syzygium fruticosum* DC: 1.花枝,2.果序。(邓晶发绘)