

长 3-5 毫米, 萼齿 4, 极短; 花瓣分离, 圆形, 长 4 毫米; 雄蕊长 4—5 毫米; 花柱与雄蕊等长。果实球形, 宽 6—7 毫米, 成熟时黑色。 花期 4—7 月。

产广东、广西等省区。常见于 1000 米以下的森林溪涧边。

55. 卫矛叶蒲桃 (广州植物志) 图版 25

Syzygium euonymifolium (Metcalf) Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 242. 1938; 广州植物志 205. 1956——*Eugenia euonymifolia* Metcalf in Lingnan Sci. Journ. 11: 22. 1932; Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl. 52B: 160. 1934.

乔木, 高达 12 米; 嫩枝圆形或压扁, 有微毛, 干后灰色, 老枝灰白色。叶片薄革质, 阔椭圆形, 长 5—9 厘米, 宽 3—4 厘米, 先端渐尖, 尖尾长 1—1.5 厘米, 基部楔形, 下延, 干后上面灰绿色, 无光泽, 下面同色, 两面多细小腺点, 侧脉相隔 2—3 毫米, 在上面明显, 在下面稍突起, 以 60° 开角斜向上, 靠近边缘 1 毫米处结合成边脉; 叶柄长 8—10 毫米。聚伞花序腋生, 长 1 厘米, 有花 6—11 朵; 花蕾长 2.5 毫米; 花梗长 1—1.5 毫米; 萼管倒圆锥形, 长 1.5—2 毫米, 萼齿 4 短而钝; 花瓣分离, 圆形, 长 2 毫米; 雄蕊长 2.5—3 毫米; 花柱与雄蕊同长。果实球形, 直径 6—7 毫米。 花期 5—8 月。

产广东、广西。

这个种的花及果实近似红鳞蒲桃 *S. hancei* Merr. et Perry, 但叶片较宽而薄, 先端有尖尾, 枝及叶干后不变黑色。

56. 红鳞蒲桃 (海南植物志)


Syzygium hancei Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 242. 1938; 广州植物志 205. 1956; 海南植物志 2: 21. 1965——*Eugenia minutiflora* Hance in Journ. Bot. 9: 1871; Forbes & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 297. 1887; Dunn & Tutchter in Kew Bull. Add. Ser. 10: 105. 1912; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 136. 1927; Groff in Lingnan Univ. Sci. Bull. 2: 77. 1930, non *S. minutiflorum* (Bedd.) Gamble (1919).

灌木或中等乔木, 高达 20 米; 嫩枝圆形, 干后变黑褐色。叶片革质, 狭椭圆形至长圆形或为倒卵形, 长 3—7 厘米, 宽 1.5—4 厘米, 先端钝或略尖, 基部阔楔形或较狭窄, 上面干后暗褐色, 不发亮, 有多数细小而下陷的腺点, 下面同色, 侧脉相隔约 2 毫米, 以 60° 开角缓斜向上, 在两面均不明显, 边脉离边缘约 0.5 毫米; 叶柄长 3—6 毫米。圆锥花序腋生, 长 1—1.5 厘米, 多花; 无花梗; 花蕾倒卵形, 长 2 毫米, 萼管倒圆锥形, 长 1.5 毫米, 萼齿不明显; 花瓣 4, 分离, 圆形, 长 1 毫米; 雄蕊比花瓣略短; 花柱与花瓣同长。果实球形, 直径 5—6 毫米。 花期 7—9 月。

产福建、广东、广西等省区。常见于低海拔疏林中。

57. 假赤楠 图版 8: 6

Syzygium buxifolioides Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 20.



卫矛叶蒲桃 *Syzygium euonymifolium* (Metcalf) Merr. et Perry: 1.花枝, 2.花 (去花瓣),
3.花萼, 4.叶片一段(示背面腺点)。(冯钟元、邓晶发绘)