

1982.

灌木或小乔木，高3米；嫩枝圆形，纤细，干后灰白色。叶片革质，细小，椭圆形，长3—4厘米，宽1.5—2厘米，先端渐尖，基部阔楔形，上面干后橄榄色，不发亮，有多数细小而下陷的腺点，下面同色，有突起腺点，侧脉相隔2毫米，在上面不明显，在下面稍能见，以45°开角斜向上，边脉离边缘0.7毫米，网脉不明显；叶柄长3—4毫米。聚伞花序腋生，长1厘米，少花；花蕾长3—4毫米。果实球形，直径1—1.2厘米，顶端宿存的萼檐长1毫米，宽2.5毫米；种子1颗。 果期11月。

产广东海南岛南部。见于低海拔密林中。

这个种近似红鳞蒲桃 *S. hancei* Merr. et Perry，但嫩枝干后白色，叶片干后不变黑褐色，先端渐尖，果实较大；它和赤楠 *S. buxifolium* Hook. et Arn. 的区别在于嫩枝圆形，叶片先端渐尖，花序腋生，果实较大。

#### 58. 海南蒲桃 图版 26: 1—2

*Syzygium hainanense* Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 20. 1982.  
——*S. brachythyrsum* Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 239. 1938, p. p.; 海南植物志 2: 20. 1965.

小乔木，高5米；嫩枝圆形，干后褐色，老枝灰白色。叶片革质，椭圆形，长8—11厘米，宽3.5—5厘米，先端急长尖，尖尾长1.5—2厘米，基部阔楔形，上面干后褐色，稍有光泽，多腺点，下面红褐色，侧脉多而密，彼此相隔1—1.5毫米，在上面能见，在下面突起，以75°—80°开角斜向上，离边缘1毫米处结合成边脉；叶柄长1—1.5厘米。花未见。果序腋生；果实椭圆形或倒卵形，长1.2—1.5厘米，宽8—9毫米，萼檐长0.5毫米，宽4毫米；种子2个，上下叠置，长与宽各6—7毫米。

产广东海南岛昌江。见于低地森林中。

本种叶形和短序蒲桃 *S. brachythyrsum* Merr. et Perry 很相似，但果实椭圆形，种子2个，上下叠置。

#### 59. 线枝蒲桃 (海南植物志) 图版 23: 3

*Syzygium araiocladum* Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 225. 1938;  
海南植物志 2: 17. 1965.

小乔木，高10米；嫩枝极纤细，圆形，干后褐色。叶片革质，卵状长披针形，长3—5.5厘米，宽1—1.5厘米，先端长尾状渐尖，尾部的长度约2厘米，尖细而弯斜，基部宽而急尖，阔楔形，上面干后橄榄绿色，下面多细小腺点，侧脉多而密，相隔约1.5毫米，以70°开角缓斜向边缘，离边缘1毫米处相结合成边脉，在上下两面均不明显；叶柄长2—3毫米。聚伞花序顶生或生于上部叶腋内，长1.5厘米，有花3—6朵；花蕾短棒状，长7—8毫米，花梗长1—2毫米；萼管长7毫米，粉白色，干后直向皱缩，萼齿4—5，三角形，长0.8毫米，先端尖；花瓣4—5，分离，卵形，长2毫米；雄蕊长3—4毫米；花柱长5毫米。果实近球

形,长5—7毫米,宽4—6毫米。花期5—6月。

产广东海南岛、广西。在海南岛雨林中常见。分布于越南。

#### 60. 锡兰蒲桃 图版 27: 1

*Syzygium zeylanicum* (Linn.) DC. Prodr. 3: 260. 1828; Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 101, 224. 1938——*Myrtus zeylanica* Linn. Sp. Pl. 471. 1753——*Eugenia zeylanica* Wight Ill. 2: 15. 1841; Duthie in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 485. 1878; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 804. 1920; Merr. Enum. Born. Pl. 434. 1921; Ridley Fl. Mal. Penin. 2: 738. 1922, non Willd.——*S. bracteatum* Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. 1: 205. 1847——*E. varians* Miq. Anal. Bot. Ind. 1: 21. 1850——*E. myrtifolia* auct. non Roxb.; Miq., l. c. 20——*S. myrtifolium* Miq. Fl. Ind. Bat. 1(1): 456. 1855——*Jambosa bracteata* Miq., op. cit. 437——*E. antiseptica* auct. non O. Ktze.; Ridley in Journ. Bot. 68: 17. 1930.

乔木;嫩枝圆形,干后黄褐色,老枝灰褐色。叶片薄革质,长卵形或卵状长圆形,长8—10.5厘米,宽3—4.5厘米,先端渐尖或尾状渐尖,尾部长1—1.5厘米,基部近圆形或钝,上面干后橄榄色,发亮,下面黄褐色,侧脉多而密,以 $80^{\circ}$ — $85^{\circ}$ 开角斜向边缘,侧脉间相隔2—3毫米,在上面明显,在下面微突起,贴近边缘1毫米处结合成边脉;叶柄长4—7毫米。圆锥花序顶生及近顶生,长2—3厘米,花序轴纤细;花梗长约2毫米;花蕾棒状,长约7毫米;萼管长5—6毫米,萼齿4—5,肾圆形,长1毫米;花瓣分离,倒卵圆形,长3—4毫米;雄蕊长于花瓣。果实球形,宽7毫米,白色。花期4—5月。

产广东西部及广西钦州。分布于中南半岛、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡、印度等地。

#### 61. 黑长叶蒲桃

*Syzygium melanophyllum* Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 22. 1982.

乔木,高16米;嫩枝圆形,干后黑褐色。叶片狭长圆形或披针形,长14—20厘米,宽4—5.5厘米,先端渐尖,尖头略钝,基部楔形,上面干后黑色,发亮,常有瘤状突起,使叶面变为粗糙,有时平滑,下面黑褐色,侧脉23—32对,在上下两面均明显突起,以 $55^{\circ}$ 开角斜行向上,靠近边缘1.5—2毫米处相结合成边脉,外侧另有1条小边脉,侧脉间相隔4—6毫米,有明显网脉;叶柄长1—2厘米。果序顶生,长约7厘米,总梗长1—1.5厘米,果梗长6—8毫米;果实球形,直径2厘米(未成熟),有白粉,果皮厚,肉质。果期4—5月。

产云南西双版纳。

这个种近似黑叶蒲桃 *S. thumra* (Roxb.) Merr. et Perry, 但叶片狭长圆形,长14—20厘米,果实较大,直径2厘米,白色,果皮厚。

#### 62. 短序蒲桃 图版 26: 3—4



1. 乌墨 *Syzygium cumini* (Linn.) Skeels var. *cumini* 果枝(幼果)。2. 水竹蒲桃 *S. fluviale* (Hemsl.) Merr. et Perry: 果枝。3. 线枝蒲桃 *S. araiocladum* Merr. et Perry: 果枝。(冯钟元绘)