

形,长5—7毫米,宽4—6毫米。花期5—6月。

产广东海南岛、广西。在海南岛雨林中常见。分布于越南。

60. 锡兰蒲桃 图版 27: 1

Syzygium zeylanicum (Linn.) DC. Prodr. 3: 260. 1828; Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 101, 224. 1938——*Myrtus zeylanica* Linn. Sp. Pl. 471. 1753——*Eugenia zeylanica* Wight Ill. 2: 15. 1841; Duthie in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 485. 1878; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 804. 1920; Merr. Enum. Born. Pl. 434. 1921; Ridley Fl. Mal. Penin. 2: 738. 1922, non Willd.——*S. bracteatum* Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. 1: 205. 1847——*E. varians* Miq. Anal. Bot. Ind. 1: 21. 1850——*E. myrtifolia* auct. non Roxb.; Miq., l. c. 20——*S. myrtifolium* Miq. Fl. Ind. Bat. 1(1): 456. 1855——*Jambosa bracteata* Miq., op. cit. 437——*E. antiseptica* auct. non O. Ktze.; Ridley in Journ. Bot. 68: 17. 1930.

乔木;嫩枝圆形,干后黄褐色,老枝灰褐色。叶片薄革质,长卵形或卵状长圆形,长8—10.5厘米,宽3—4.5厘米,先端渐尖或尾状渐尖,尾部长1—1.5厘米,基部近圆形或钝,上面干后橄榄色,发亮,下面黄褐色,侧脉多而密,以 80° — 85° 开角斜向边缘,侧脉间相隔2—3毫米,在上面明显,在下面微突起,贴近边缘1毫米处结合成边脉;叶柄长4—7毫米。圆锥花序顶生及近顶生,长2—3厘米,花序轴纤细;花梗长约2毫米;花蕾棒状,长约7毫米;萼管长5—6毫米,萼齿4—5,肾圆形,长1毫米;花瓣分离,倒卵圆形,长3—4毫米;雄蕊长于花瓣。果实球形,宽7毫米,白色。花期4—5月。

产广东西部及广西钦州。分布于中南半岛、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡、印度等地。

61. 黑长叶蒲桃

Syzygium melanophyllum Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 22. 1982.

乔木,高16米;嫩枝圆形,干后黑褐色。叶片狭长圆形或披针形,长14—20厘米,宽4—5.5厘米,先端渐尖,尖头略钝,基部楔形,上面干后黑色,发亮,常有瘤状突起,使叶面变为粗糙,有时平滑,下面黑褐色,侧脉23—32对,在上下两面均明显突起,以 55° 开角斜行向上,靠近边缘1.5—2毫米处相结合成边脉,外侧另有1条小边脉,侧脉间相隔4—6毫米,有明显网脉;叶柄长1—2厘米。果序顶生,长约7厘米,总梗长1—1.5厘米,果梗长6—8毫米;果实球形,直径2厘米(未成熟),有白粉,果皮厚,肉质。果期4—5月。

产云南西双版纳。

这个种近似黑叶蒲桃 *S. thumra* (Roxb.) Merr. et Perry, 但叶片狭长圆形,长14—20厘米,果实较大,直径2厘米,白色,果皮厚。

62. 短序蒲桃 图版 26: 3—4

Syzygium brachythyrsum Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 239. 1938.

小乔木，高3—12米；嫩枝圆形或稍压扁，干后灰褐色，纤细。叶片厚纸质，椭圆形至椭圆卵形，长8—12厘米，宽2.5—5厘米，先端尾状渐尖，尾长1.5厘米，基部楔形，干后上面暗褐色，下面黄褐色，侧脉多而密，彼此相隔1—2毫米，缓斜向上，贴近边缘结合成边脉，在上面明显能见，在下面突起，小脉为疏网状；叶柄长约1厘米，纤细，黑褐色。聚伞花序顶生，有花5—8朵，花序轴长1—1.5厘米，次级分枝极短；花蕾无梗或有短梗，长约6毫米，上部宽约4.5毫米；萼管倒锥形，萼齿4，半圆形，长约1毫米，宽约2毫米，先端钝；花瓣分离，卵形，长3毫米；雄蕊长2—3毫米。果实球形，直径1.5厘米。花期8月。

产云南东南部。见于中海拔常绿林里。

原作者发表这个种时，以为它也分布于海南岛（刘心祈1324）；模式标本，蔡希陶61581采自屏边，是一个具花标本，原作者错把海南岛刘心祈1324这个具有椭圆形果实的标本搭配上去。我们翻阅屏边大围山，王孝100207标本，这个种应该是具有球形的果实，特予更正。至于刘心祈1324的海南岛标本应为海南蒲桃 *S. hainanense* Chang et Miao.

63. 细脉蒲桃

Syzygium euphlebia (Hayata) Mori in Trans. Nat. Hist. Soc. Form. 28: 439. 1938—*Eugenia euphlebia* Hayata Icon. Pl. Form. 3: 119. 1913.

灌木；嫩枝近圆形或稍有钝棱，纤细，干后灰白色。叶片薄革质，倒卵形或椭圆形，长5—6厘米，宽2—3厘米，先端急短尖，尖头钝，基部楔形，上面暗橄榄色，不发亮，有微细腺点，下面淡褐色，有明显腺点，侧脉多而密，彼此相隔2毫米，干后在上下两面均稍突起，以65°开角斜向上；叶柄长约1厘米。圆锥花序顶生，2—3次分枝，少花；花无梗，2—3朵簇生；萼管钟形，长3毫米，顶部宽3.5毫米，萼齿4，长0.5毫米，先端极钝；花瓣4，圆形，长3毫米；雄蕊长3—5毫米；花柱长6毫米，子房2室。

我国台湾特有。


这个种近似万宁蒲桃 *S. howii* Merr. et Perry，但叶片先端较钝，基部也较狭窄。

64. 尖峰蒲桃

Syzygium jienfunicum Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 19. 1982.

乔木；嫩枝圆形或有钝棱，深灰褐色。叶片革质，长圆形，长5—7.5厘米，宽2.5—3.5厘米，先端渐尖或短尖，基部楔形，下延，上面干后灰褐色，稍发亮，多微小腺点，下面稍带褐色，侧脉相隔2—3毫米，在上面不明显，在下面稍能见，以60°开角缓斜向上，离边缘1毫米处结合成边脉；叶柄长4—7毫米。果序顶生，有果实3个，在中央的有长3—4毫米的短梗，在两侧的无梗，果实球形，直径1厘米，萼檐不突起；种子1颗。果期1月。

产广东海南岛。生于尖峰岭的独岭，不常见。



1—2. 海南蒲桃 *Syzygium hainanense* Chang et Miao: 1. 枝条, 2. 果。 3—4. 短序蒲桃 *S. brachythyrsum* Merr. et Perry: 3. 花枝, 4. 果。(冯钟元绘)