

Syzygium brachythyrsum Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 239. 1938.

小乔木，高3—12米；嫩枝圆形或稍压扁，干后灰褐色，纤细。叶片厚纸质，椭圆形至椭圆卵形，长8—12厘米，宽2.5—5厘米，先端尾状渐尖，尾长1.5厘米，基部楔形，干后上面暗褐色，下面黄褐色，侧脉多而密，彼此相隔1—2毫米，缓斜向上，贴近边缘结合成边脉，在上面明显能见，在下面突起，小脉为疏网状；叶柄长约1厘米，纤细，黑褐色。聚伞花序顶生，有花5—8朵，花序轴长1—1.5厘米，次级分枝极短；花蕾无梗或有短梗，长约6毫米，上部宽约4.5毫米；萼管倒锥形，萼齿4，半圆形，长约1毫米，宽约2毫米，先端钝；花瓣分离，卵形，长3毫米；雄蕊长2—3毫米。果实球形，直径1.5厘米。花期8月。

产云南东南部。见于中海拔常绿林里。

原作者发表这个种时，以为它也分布于海南岛（刘心祈1324）；模式标本，蔡希陶61581采自屏边，是一个具花标本，原作者错把海南岛刘心祈1324这个具有椭圆形果实的标本搭配上去。我们翻阅屏边大围山，王孝100207标本，这个种应该是具有球形的果实，特予更正。至于刘心祈1324的海南岛标本应为海南蒲桃 *S. hainanense* Chang et Miao.

63. 细脉蒲桃

Syzygium euphlebia (Hayata) Mori in Trans. Nat. Hist. Soc. Form. 28: 439. 1938—*Eugenia euphlebia* Hayata Icon. Pl. Form. 3: 119. 1913.

灌木；嫩枝近圆形或稍有钝棱，纤细，干后灰白色。叶片薄革质，倒卵形或椭圆形，长5—6厘米，宽2—3厘米，先端急短尖，尖头钝，基部楔形，上面暗橄榄色，不发亮，有微细腺点，下面淡褐色，有明显腺点，侧脉多而密，彼此相隔2毫米，干后在上下两面均稍突起，以65°开角斜向上；叶柄长约1厘米。圆锥花序顶生，2—3次分枝，少花；花无梗，2—3朵簇生；萼管钟形，长3毫米，顶部宽3.5毫米，萼齿4，长0.5毫米，先端极钝；花瓣4，圆形，长3毫米；雄蕊长3—5毫米；花柱长6毫米，子房2室。

我国台湾特有。

这个种近似万宁蒲桃 *S. howii* Merr. et Perry，但叶片先端较钝，基部也较狭窄。

64. 尖峰蒲桃

Syzygium jienfunicum Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 19. 1982.

乔木；嫩枝圆形或有钝棱，深灰褐色。叶片革质，长圆形，长5—7.5厘米，宽2.5—3.5厘米，先端渐尖或短尖，基部楔形，下延，上面干后灰褐色，稍发亮，多微小腺点，下面稍带褐色，侧脉相隔2—3毫米，在上面不明显，在下面稍能见，以60°开角缓斜向上，离边缘1毫米处结合成边脉；叶柄长4—7毫米。果序顶生，有果实3个，在中央的有长3—4毫米的短梗，在两侧的无梗，果实球形，直径1厘米，萼檐不突起；种子1颗。果期1月。

产广东海南岛。生于尖峰岭的独岭，不常见。