

序轴略有棱;花有短花梗,常3朵簇生;花蕾卵圆形,长2—2.5毫米;萼管倒圆锥形,长2毫米,萼齿浅波状;花瓣圆形,长2毫米;雄蕊长4—5毫米;花柱长4毫米。

我国台湾特有。

这个种近似红鳞蒲桃 *S. hancei* Merr. et Perry, 但花序较长,花亦较大。李惠林 (Woody Flora of Taiwan, 649 页) 把它合并到尖萼蒲桃 *S. acutisepalum* (Hayata) Mori, 但本种嫩枝圆形,无毛,侧脉不近于垂直,花柄较短。

68. 石生蒲桃

Syzygium saxatile Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 22. 1982.

灌木;嫩枝圆形,无毛。叶片革质,倒披针形,长5—8厘米,宽1.5—2.5厘米,先端略尖,基部楔形,上面深绿色,发亮,下面稍带褐色,侧脉密,边脉离边缘1毫米;叶柄长约3毫米。聚伞花序顶生,长1.5—2厘米,少花,总梗长5—7毫米;花梗长1—2毫米;萼管倒圆锥形,长4—5毫米,无毛,萼齿钝;花瓣4,阔卵形,长3毫米;雄蕊长3—4毫米;花柱略与雄蕊等长。

产云南西畴、那波、三岔河。生于峡谷溪旁。

69. 山蒲桃 图版 29: 1—2

Syzygium levinei (Merr.) Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 110. 1938; 广州植物志 204. 1956; 海南植物志 2: 18. 1965——*Eugenia millettiana* auct. non Hemsl.; Dunn & Tutchter in Kew Bull. Add. Ser. 10: 105. 1912; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 823. 1920; McClure in Lingnan Univ. Sci. Bull. 3: 30. 1931.

常绿乔木,高达24米;嫩枝圆形,有糠秕,干后灰白色。叶片革质,椭圆形或卵状椭圆形,长4—8厘米,宽1.5—3.5厘米,先端急锐尖,基部阔楔形,上面干后灰褐色,下面同色或稍淡,两面有细小腺点,侧脉以45°开角斜向上,脉间相隔2—3毫米,靠近边缘0.5毫米处结合成边脉;叶柄长5—7毫米。圆锥花序顶生和上部腋生,长4—7厘米,多花,花序轴多糠秕或乳状突;花蕾倒卵形,长4—5毫米;花白色,有短梗;萼管倒圆锥形,长3毫米,萼齿极短,有1小尖头;花瓣4,分离,圆形,长约2.5—3毫米;雄蕊长5毫米;花柱长4毫米。果实近球形,长7—8毫米;种子1颗。花期8—9月。

产广东、广西等省区。常见于低海拔疏林中。分布于越南。

70. 黑叶蒲桃 图版 29: 3

Syzygium thumra (Roxb.) Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 103. 1938——*Eugenia thumra* Roxb. Fl. Ind. ed. 2, 2: 495. 1832; Duthie in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 481. 1879.

乔木,高8米;嫩枝圆形或稍压扁,干后褐色。叶片卵状椭圆形,长10—15厘米,宽5—7厘米,先端钝或略尖,基部宽而钝,上面干后黑色,有光泽,下面黑褐色,侧脉约25