

序轴略有棱;花有短花梗,常3朵簇生;花蕾卵圆形,长2—2.5毫米;萼管倒圆锥形,长2毫米,萼齿浅波状;花瓣圆形,长2毫米;雄蕊长4—5毫米;花柱长4毫米。

我国台湾特有。

这个种近似红鳞蒲桃 *S. hancei* Merr. et Perry, 但花序较长,花亦较大。李惠林 (Woody Flora of Taiwan, 649 页) 把它合并到尖萼蒲桃 *S. acutisepalum* (Hayata) Mori, 但本种嫩枝圆形,无毛,侧脉不近于垂直,花柄较短。

68. 石生蒲桃

Syzygium saxatile Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 22. 1982.

灌木;嫩枝圆形,无毛。叶片革质,倒披针形,长5—8厘米,宽1.5—2.5厘米,先端略尖,基部楔形,上面深绿色,发亮,下面稍带褐色,侧脉密,边脉离边缘1毫米;叶柄长约3毫米。聚伞花序顶生,长1.5—2厘米,少花,总梗长5—7毫米;花梗长1—2毫米;萼管倒圆锥形,长4—5毫米,无毛,萼齿钝;花瓣4,阔卵形,长3毫米;雄蕊长3—4毫米;花柱略与雄蕊等长。

产云南西畴、那波、三岔河。生于峡谷溪旁。

69. 山蒲桃 图版 29: 1—2

Syzygium levinei (Merr.) Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 110. 1938; 广州植物志 204. 1956; 海南植物志 2: 18. 1965——*Eugenia millettiana* auct. non Hemsl.; Dunn & Tutchter in Kew Bull. Add. Ser. 10: 105. 1912; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 823. 1920; McClure in Lingnan Univ. Sci. Bull. 3: 30. 1931.

常绿乔木,高达24米;嫩枝圆形,有糠秕,干后灰白色。叶片革质,椭圆形或卵状椭圆形,长4—8厘米,宽1.5—3.5厘米,先端急锐尖,基部阔楔形,上面干后灰褐色,下面同色或稍淡,两面有细小腺点,侧脉以45°开角斜向上,脉间相隔2—3毫米,靠近边缘0.5毫米处结合成边脉;叶柄长5—7毫米。圆锥花序顶生和上部腋生,长4—7厘米,多花,花序轴多糠秕或乳状突;花蕾倒卵形,长4—5毫米;花白色,有短梗;萼管倒圆锥形,长3毫米,萼齿极短,有1小尖头;花瓣4,分离,圆形,长约2.5—3毫米;雄蕊长5毫米;花柱长4毫米。果实近球形,长7—8毫米;种子1颗。花期8—9月。

产广东、广西等省区。常见于低海拔疏林中。分布于越南。

70. 黑叶蒲桃 图版 29: 3

Syzygium thumra (Roxb.) Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 103. 1938——*Eugenia thumra* Roxb. Fl. Ind. ed. 2, 2: 495. 1832; Duthie in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 481. 1879.

乔木,高8米;嫩枝圆形或稍压扁,干后褐色。叶片卵状椭圆形,长10—15厘米,宽5—7厘米,先端钝或略尖,基部宽而钝,上面干后黑色,有光泽,下面黑褐色,侧脉约25

对,彼此相隔3—6毫米,在两面均突起,以80°开角平缓走向边缘,离边缘2毫米处结合成边脉,侧脉之间有明显网脉;叶柄长6—8毫米。圆锥花序顶生,长9厘米,宽7厘米,总梗圆形,变黑色;花3朵簇生,花梗长2—3毫米;花蕾倒卵形,长5毫米,宽4毫米;萼管倒圆锥形,长3毫米,萼齿4,半圆形,长1毫米,宽2.5毫米;花瓣分离,阔卵形,长2.5毫米;雄蕊短;花柱与雄蕊同长。果实球形,直径1.2厘米,干后黑色。花期4月。

产云南西双版纳。分布于缅甸、马来西亚。

71. 高檐蒲桃 图版 30: 1

Syzygium oblatum (Roxb.) Wall. Cat. n. 3569. 1831, nom. nud.; Cowan et Cowan Trees North. Beng. 68. 1929, descr.—*Eugenia oblata* Roxb. Hort. Beng. 37. 1814, nom. nud. et Fl. Ind. ed. 2, 2: 493. 1832; Wight Ill. 2: 15. 1841; Kurz For. Fl. Brit. Burma 1: 488. 1877; Duthie in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 492. 1879—*Jambosa pulchella* Miq. Fl. Ind. Bat. 1(1): 422. 1855.

乔木,高12米;嫩枝圆形,干后暗褐色。叶片椭圆形或长椭圆形,长9—12厘米,宽4—6厘米,先端渐尖,基部圆形或阔楔形,上面干后灰褐色,暗晦或有光泽,腺点不明显,下面色稍浅,有多数小腺点,中脉下陷,侧脉多而密,彼此相隔2—3毫米,近于水平开出,在靠近边缘不到1毫米处互相结合成边脉;叶柄长不及1厘米。圆锥花序顶生,少数腋生,长4—7厘米,总梗短,多分枝;花梗长1毫米;萼管倒圆锥形,长4—5毫米,萼齿4,有时5片,短三角形,长1毫米,宽2—3毫米;花瓣4,卵形,长约5毫米;雄蕊比花瓣长;花柱几与雄蕊等长。果实球形,直径1—1.5厘米,上部有高1.5毫米的宿存萼檐;种子1颗。花期4月。

产云南西双版纳一带。生于低海拔森林中。分布于马来西亚、中南半岛、印度等地。

72. 褐背蒲桃 图版 30: 2

Syzygium infra-rubiginosum Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 23. 1982.

乔木,高14米;嫩枝圆形,干后黑褐色,老枝褐色。叶片革质,椭圆形,长6.5—9.5厘米,宽3—4厘米,先端急短尖,尖头长5—10毫米,基部钝或阔楔形,常不等侧,上面干后黑褐色,不发亮,多细小的腺点,下面红褐色,侧脉密,彼此相隔1—1.5毫米,在上面不明显,在下面稍突起,以80°开角缓斜向上,离边缘1毫米处结合成边脉;叶柄长1—1.2厘米。圆锥花序顶生或近顶生,长4—6厘米,总梗长2—3厘米,次级总梗长1—1.5厘米;无花梗;花蕾倒卵形,长6毫米;萼管倒圆锥形,长4—5毫米,萼齿短三角形;花瓣分离,近圆形,直径2.5毫米;雄蕊长3毫米;花柱长4—5毫米。花期11月。

产广东海南岛东方一带。

这个种和乌墨 *S. cumini* (Linn.) Skeels 的区别在于花序顶生,花较大,叶背红褐色;和密脉蒲桃 *S. chunianum* Merr. et Perry 的区别在于花序较长,多花,花较大。



1—2. 山蒲桃 *Syzygium levinei* (Merr.) Merr. et Perry: 1. 果枝, 2. 花(去花瓣)。3. 黑叶蒲桃 *S. thumra* (Roxb.) Merr. et Perry: 花枝。(冯钟元绘)