

73. 长花蒲桃 图版 28: 2

Syzygium lineatum (DC.) Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 109. 1938—*Myrtus lineata* Blume Bijdr. 1087. 1826, non Sw.—*Jambosa lineata* DC. Prodr. 3: 287. 1828—*Clavimyrthus latifolia* Blume Mus. Bot. Lugd.-Bat. 1: 117. 1849—*S. longiflorum* Presl Bot. Bemerk. 70. 1844.

乔木;嫩枝圆形,干后黑褐色,老枝灰白色。叶片革质,椭圆形或卵状椭圆形,长6—8厘米,宽2.5—3.5厘米,先端渐尖,尖头长1—1.5厘米,基部宽而钝,上面深褐色,发亮,有小腺点,下面稍浅色,多腺点,侧脉密,脉间相隔1毫米,在上面不明显,在下面纤细能见,以75°开角斜向上,边脉离边缘不到1毫米;叶柄长1—1.2厘米。圆锥花序顶生,长8—10厘米,3次分枝,多花;无花梗;花蕾梨形,长6—7毫米;萼管倒圆锥形,长5毫米,萼齿短半圆形;花瓣分离,卵形,长3毫米;雄蕊长5—7毫米;花柱长6—7毫米。果实椭圆形,长约1厘米。花期4月。

产广西龙津。分布于中南半岛、马来西亚。

9. 水翁属——**Cleistocalyx** Blume

Blume Mus. Bot. Lugd.-Bat. 1: 84. 1849; Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 18: 326. 1937; 广州植物志 206. 1956; 海南植物志 2: 21. 1965.

乔木。叶对生,羽状脉较疏,腺点明显;有叶柄。圆锥花序由多数聚伞花序组成,花数朵,有柄或无柄,簇生成歧伞花序;苞片小,早落;萼管倒圆锥形,萼片连合成帽状体,花开放时整块脱落;花瓣4—5,分离,覆瓦状排列,常附于帽状萼上一并脱落;雄蕊多数,分离,排成多列,花药卵形,背部着生,纵裂;花柱比雄蕊短,柱头稍扩大,子房下位,通常2室,胚珠少数。果为浆果,顶端有残存环状的萼檐;种子1颗,子叶厚,种皮薄,胚直。

模式种: *Cleistocalyx nitidus* Bl.

约20余种,分布于亚洲热带地区及大洋洲。我国有2种,产广东、广西及云南等地。

分 种 检 索 表

1. 叶片长圆形或椭圆形,侧脉相隔8—9毫米;花序侧生;果宽1—1.4厘米 1. 水翁 *C. operculatus* Merr. et Perry
1. 叶片卵圆形或倒卵圆形,侧脉相隔2—5毫米;花序顶生;果宽1.5—2厘米 2. 大果水翁 *C. conspersipunctatus* Merr. et Perry

1. 水翁 (广州植物志) 水榕 (广东)



1. 团花蒲桃 *Syzygium congestiflorum* Chang et Miao: 果枝(幼果)。2. 长花蒲桃 *S. lineatum* (DC.) Merr. et Perry: 花枝。(黄锦添、邓晶发绘)