

产广东海南岛。生于中海拔森林谷地。

4. 桃金娘族——Trib. Myrteae Nied.

Nied. in Engl. u. Prantl Nat. Pflanzenfam. 3(7): 64. 1893.

花丝在花蕾时常向内弯曲; 胚马蹄形或螺旋状扭曲, 胚轴极为粗壮, 子叶常细小。

本族有 5 属, 其中 2 属为引种栽培。

10. 桃金娘属——*Rhodomyrtus* (DC.) Reich.

Reich. Nom. 117. 1841; 海南植物志 2: 7. 1965——*Myrtus* Sect.

Rhodomyrtus DC. Prodr. 3: 240. 1828.

灌木或乔木。叶对生, 离基三出脉。花较大, 1—3 朵腋生; 萼管卵形或近球形, 萼裂片 4—5 片, 革质, 宿存; 花瓣 4—5 片, 比萼片大; 雄蕊多数, 分离, 排成多列, 通常比花瓣短, 花药背部及近基部着生, 纵裂; 子房下位, 与萼管合生, 1—3 室, 每室有胚珠 2 列或于 2 列胚珠间出现假隔膜而成 2—6 室, 有时假隔膜横列, 把子房分割为上下叠置的多数假室, 花柱线形, 柱头扩大为头状或盾状。浆果卵状壶形或球形, 有多数种子; 种子压扁, 肾形或近球形, 种皮坚硬, 胚弯曲或螺旋状, 胚轴长, 子叶小。

模式种: 桃金娘 *Rhodomyrtus tomentosa* (Ait.) Hassk.

约 18 种, 分布于亚洲热带及大洋洲。我国有 1 种, 见于华南各地。

1. 桃金娘 (种子植物名称) 岗桧(广东) 图版 32: 1—2

Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk. Fl. Beibl. 2: 1842; Benth. in Journ. Bot. 2: 220. 1843; Wight Spicil. Neilgher. 1: 60, t. 71. 1845; Miq. Fl. Ind. Bat. 1(1): 477. 1855; Benth. Fl. Hongk. 121. 1861; Duthie in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 469. 1878; Forbes & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 295. 1877; Nied. in Engl. u. Prantl Nat. Pflanzenfam. 3(7): 70, f. 37. 1893; Henry in Trans. As. Soc. Japan 24(Suppl.): 43. 1896; Matsum. in Bot. Mag. Tokyo 12: 68. 1898; Matsum & Hayata Enum. Pl. Formos. 142. 1906; Merr. in Philipp. Journ. Sci. Bot. 3: 423. 1908; Hayata Icon. Pl. Formos. 2: 18. 1912; Gibbs in Journ. Linn. Soc. Bot. 42: 76. 1914; Kanehira Formos. Trees 258. 1917; Crevost & Lecte. Cat. Prod. Indochine 1: 251. 1917; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 794. f. 85. 1920; Merr. Enum. Born. Pl. 425. 1921; Ridley Fl. Mal. Penin. 1: 717. 1922; Merr. Enum. Philip. 3: 156. 1923; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1(1): 183. 1924; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 136. 1927; Groff in Lingnan