

6—10 毫米;苞片线状披针形,小苞片细小,生于花托基部;萼管倒锥形,被柔毛,裂片5,阔卵形,短于1毫米;花瓣5,白色,卵形,长2.5毫米,边缘有睫毛;雄蕊无毛,长短不一;花柱约与雄蕊等长。浆果球形,直径3—4毫米,有种子4—5,干后有纵沟。花期春夏间。

产云南。分布于中南半岛、马来西亚及印度等地。

嫩枝有毛,叶长圆状披针形,花序较大,多花,花5数,萼片短,卵形,在我国只见于云南。前人的报道认为本种也见于广东、广西,其实广东、广西的标本均为4数的花,应属于华夏子楝树 *D. esquirolii* (Lévl.) Chang et Miao.

2. 琼南子楝树

Decaspermum austro-hainanicum Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 24. 1982.

灌木;嫩枝被灰褐色柔毛,老枝灰色,无毛。叶片革质,长倒卵形或倒卵形,初时上下两面被灰色柔毛,以后变无毛,长3—5厘米,宽1.7—2.6厘米,先端急短尖,尖头钝,基部楔形,干后上面暗褐色,稍发亮,有多数细小而陷下的腺点,下面深褐色,侧脉5—7对,不明显或有时隐约可见;叶柄长4—7毫米。花单生或3—5朵排成总状或聚伞花序,生于枝顶叶腋内;花梗长4—8毫米,被褐毛;苞片长圆形或披针形,长2—4毫米,被褐毛;小苞片鳞片状;萼管短,萼片5,阔卵形,长不及1毫米,被灰毛;花瓣5,卵形,长2毫米,外侧有稀疏柔毛;雄蕊比花瓣略长,无毛。

产广东海南岛崖县洋林山。

在国产3个具有5数花的种类当中,彼此并不接近。本种的嫩枝及花序有毛,叶片倒卵形,花单生或3—5朵排成聚伞花序,萼齿短。从外形上看来,它近似柬埔寨子楝树 *D. cambodianum* Gagnep., 但后者嫩枝及花序均无毛,叶较大,花4数。

3. 白毛子楝树 (海南植物志)

Decaspermum albociliatum Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 202. 1938; 海南植物志 2: 10. 1965.

灌木;嫩枝纤细,被白色长茸毛。叶片纸质或薄革质,披针形,长3—6.5厘米,宽1—2.5厘米,顶端尾状渐尖,基部近圆形或钝,初时上下两面被毛,以后变无毛,在两面有多数细小的腺点,侧脉约12对,不明显;叶柄极短,长约2毫米。花单生或2朵聚伞状,腋生;花梗长3—10毫米,被长丝毛;小苞片线形,长5—7毫米,被毛;萼管被长丝毛,萼片5,线状披针形,长约5毫米,宿存,被毛;花瓣披针形,长5—6毫米,被毛,先端长尖;雄蕊比花瓣短,花丝无毛;花柱约与雄蕊等长。浆果球形,被毛,直径4—5毫米。花期6—9月。

产广东海南岛。见于低海拔至中海拔的森林中和林谷溪边。

枝及叶被白色长茸毛,叶片卵状披针形,叶柄极短,花常单生,萼片线状披针形,花瓣