

披针形,在具有 5 数花的种类当中,是最具明显特征的种。

4. 柬埔寨子楝树 (海南植物志)

Decaspermum cambodianum Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 26: 73. 1920 et in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 846. f. 91. 1921; Merr. & Chun in Sunyatsenia 2: 291. 1935; Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 201. 1938; 海南植物志 2: 9. 1965——*Eugenia multipunctata* Merr. in Journ. Arn. Arb. 6: 138. 1925 et in Lingnan Sci. Journ. 5: 136. 1927.——*E. ciliaris* Ridley in Kew Bull. 2: 74. 1928.

乔木,高约 12 米;嫩枝无毛,干后黑褐色。叶片革质,椭圆形或倒卵形,长 5.5—8 厘米,宽 2.5—5 厘米,先端短尖,尖头钝,基部楔形,两面无毛,干后上面暗褐色,有多数小腺点,下面灰褐色,侧脉 9—10 对,不明显;叶柄长 5—7 毫米。聚伞花序腋生,长 1.5—4 厘米,少花,无毛,总梗有棱;花白色,4 数;苞片披针形,长 2 毫米;萼管倒圆锥形,萼片卵形,宿存,无毛;花瓣卵形,长 2—3 毫米,无毛;雄蕊多数,花丝无毛。浆果球形,直径 4—5 毫米;种子 4—5 个。花期 4—5 月。

产广东海南岛。见于中海拔至高海拔的森林中。分布于中南半岛至马来西亚。

嫩枝及叶无毛,叶片倒卵形,是国产种类中叶片最大的代表,花序及花均无毛,花 4 数,萼片短,同其他种易于区别。

5. 秃子楝树

Decaspermum glabrum Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 25. 1982.

灌木;嫩枝纤细,圆柱形,无毛,干后黑褐色。叶片纸质,卵状披针形或披针形,长 2.5—5 厘米,宽 1—1.7 厘米,先端长尖,基部楔形或略钝,干后上面变黑色,稍发亮,下面深褐色,绝对无毛,多细小腺点,侧脉不明显;叶柄长 3—5 毫米,纤细,无毛。聚伞花序腋生,长约 3 厘米,有花 4—9 朵,总梗及花梗纤细,无毛;苞片小叶状,长 6—8 毫米,小苞片针形,长 2 毫米,均无毛。花 4 数,萼管无毛,萼片三角状卵形,先端尖,长 1.5 毫米,无毛;花瓣倒卵形,长 2—2.5 毫米,边缘有稀疏睫毛;雄蕊比花瓣稍长,无毛。

产广东西部湛江地区的山地。

外形很像子楝树 *D. gracilentum* Merr. et Perry, 但嫩枝及叶片均无毛,花 4 数,总梗纤细,花序及花亦无毛。在具有 4 数花的一群当中,它和柬埔寨子楝树 *D. cambodiana* Gagnep. 很容易分离开,后者的叶片倒卵形,宽达 5 厘米,花的特征则很相似。它和华夏子楝树 *D. esquirolii* (Lévl.) Chang et Miao 也容易区别,后者的枝和叶有毛,萼片钝,被毛,花瓣也较长。

6. 华夏子楝树

Decaspermum esquirolii (Lévl.) Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 25. 1982.——*Eugenia esquirolii* Lévl. in Fedde Rep. Sp. Nov. 9: 459. 1911