

14. 多核果属——*Pyrenocarpa* Chang et Miao

Chang et Miao in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyats. 1: 62. 1975.

常绿乔木；嫩枝圆形或有棱。叶革质，对生，全缘，具羽状脉，有透明油腺点；有叶柄。花两性与单性异株，排成顶生聚伞花序；苞片小叶状，小苞片2，生于萼管基部；萼管倒圆锥形，被毛，萼片5，覆瓦状排列；花瓣5，覆瓦状排列，有腺点；雄蕊多数，生于花盘上，排成多列，在花蕾时卷曲，花丝细长，分离，花药球形，2室，直裂，背部着生，顶端无腺体；子房下位，11—13室，花柱线形，柱头稍扩大，胚珠每室1颗，着生于中轴胎座上。核果扁球形，有分核11—13个，每个分核有种子1个，胚弯曲，马蹄形。

2种，广东海南岛特有。

分 种 检 索 表

1. 嫩枝有棱；叶片长圆形，侧脉20对，花序柄有棱……………1. 多核果 *P. hainanensis* (Merr.) Chang et Miao
 1. 嫩枝圆形；叶片椭圆形或倒卵形，侧脉12—15对；花序轴圆柱形……………
 …………… 2. 圆枝多核果 *P. teretis* Chang et Miao

1. 多核果 图版 33

Pyrenocarpa hainanensis (Merr.) Chang et Miao in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyats. 1: 63. 1975——*Eugenia hainanensis* Merr. in Philipp. Journ. Sci. 23: 255. 1923——*Decaspermum hainanense* (Merr.) Merr. et Perry in Lingnan Sci. Journ. 14: 42. f. 13. 1935, p. p.; 海南植物志 2: 9. 1965.

乔木，高10米；嫩枝四角形，有4棱，被灰褐色柔毛。叶片长圆形，初时两面有毛，不久变无毛，长5—9厘米，宽2—2.5厘米，先端略尖，尖头钝，基部楔形，上面干后深绿色，发亮，下面黄绿色，侧脉约20对，隐约能见，以65°开角斜行，离边缘1毫米处相结合成边脉；叶柄长5—10毫米。聚伞花序组成圆锥花序，生枝顶叶腋内，长4—8厘米，多花，总梗长2—3厘米，有棱，被毛；花梗长1—2.5厘米，亦有棱；苞片倒卵形，长1—1.5厘米，小苞片披针形，长3毫米，均被毛；花白，直径1.7—2厘米；萼片5，卵形，长2毫米，有毛；花瓣卵形，长7—8毫米，宽4—5毫米，先端尖，有腺点；雄蕊长7—8毫米，红色，花丝有微毛；萼管有茸毛；子房11—13室，花柱长7—8毫米，柱头扩大。核果扁球形，直径7—8毫米，分核11—13个，扁平。花期4月。

产广东海南岛南部及东部常绿林中。

2. 圆枝多核果

Pyrenocarpa teretis Chang et Miao in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyats. 1: