

1. 玫瑰木 (海南植物志)

Rhodamnia dumetorum (Poir.) Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 195. 1938; 海南植物志 2: 8. 1965——*Myrtus dumetora* Poir. Encycl. Suppl. 4: 52. 1816——*M. trinervia* Lour. Fl. Cochinch. 312. 1790——*Eugenia* ? *dumetora* DC. Prodr. 3: 284. 1828——*R. siamensis* Craib in Kew Bull. 4: 167. 1926 et Fl. Siam. Enum. 629. 1931——*R. trinervia* auct. non Blume; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 844. 1921, pro parte (fide Craib); Merr. in Trans. Amer. Philos. Soc. 24(2): 283. 1935.

1a. 玫瑰木 (原变种)

var. **dumetorum**

小乔木, 高达 6 米; 嫩枝有灰色短柔毛, 圆形, 老枝无毛, 褐色。叶片革质, 狭窄椭圆形或狭卵形, 长 6—10 厘米, 宽 2.5—3.5 厘米, 先端渐尖, 基部钝或近圆形, 上面初时有柔毛, 以后变无毛, 下面有灰白色柔毛, 以后亦变无毛, 离基三出脉离基部 3—4 毫米, 直达叶尖, 与纤细而平行的小脉在两面均明显; 叶柄长 5—10 毫米, 被毛。花白色, 常 3 朵排成聚伞花序或单生, 总梗长 1 厘米; 花梗长短不一; 花蕾梨形, 长 7 毫米, 上部宽 3.5 毫米; 萼管卵形, 长 4 毫米, 有白茸毛, 萼齿卵形, 长 1.5—2 毫米, 有毛; 花瓣倒卵形, 长 6 毫米, 外面有灰白毛; 雄蕊多数, 黄色, 长 4—5 毫米; 子房下位, 与萼管合生。浆果卵球形, 长 8 毫米, 宽 6 毫米, 顶部有宿存萼片, 外面有毛。 花期 6—7 月。

产广东海南岛南部。见于低海拔森林中。分布于马来西亚及中南半岛等地。

1b. 海南玫瑰木 (变种) (海南植物志) 图版 34

var. **hainanensis** Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 196. 1938; 海南植物志 2: 8. 图 202. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 992. 图 3713. 1972.

叶片卵形或狭卵形, 长 4—6.5 厘米, 宽 2.5—3.5 厘米, 先端急尖, 下面有宿存的灰白色短柔毛; 花及果实的形态和玫瑰木一致。

广东海南岛特有, 仅见于南部森林里。在海拔 600 米以上的沟谷湿荫生境中散生, 中等乔木, 高达 15 米, 胸径 40 厘米。

5. 南美香桃族——Trib. Myrcieae Melch.

Melch. in Engl. Syll. Pflanzenfam. 12 Aufl. 2 Band. 352. 1964.

胚有大型、叶状、皱褶的子叶和等长的下胚轴。

本族在我国引种有 1 属 1 种。