

1. **地 惹**(广州植物志) 铺地锦(岭南采药录), 山地惹(生草药性备要), 紫茄子、山辣茄(浙江), 库卢子(江西), 土茄子、地蒲根(湖南), 地脚惹(广东), 地樱子、地枇杷(广西)

**Melastoma dodecandrum** Lour. Fl. Cochinch. 274. 1790, ed. Willd. 336. 1793; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 597. 1933; Merr. in Trans. Am. Philos. Soc. ii. 24: 287. 1935; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 6. 1944; 广州植物志 221. 图 103. 1956; 中国高等植物图鉴 2: 1002. 图 3733. 1972; C. Chen in Journ. South China Agr. Coll. 4(1): 32. fig. 1—3. 1983——*M. repens* Desr. in Lam. Encycl. 4: 54. 1796; Hance in Journ. Bot. 7: 296. 1869; Benth. Fl. Hongk. 113. 1861; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 300. 1887; Guillaum. in Lecte. Not. Syst. 2: 317. fig. 7, 2. 1913, Bull. Soc. Bot. France 60: 402. 1913 et in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 885. fig. 97, 2. 1921 ——*Osbeckia repens* DC. Prodr. 3: 142. 1828——*Asterostoma repens* Blume Mus. Bot. Lugd. Bat. 1: 50. 1849.

小灌木, 长 10—30 厘米; 茎匍匐上升, 逐节生根, 分枝多, 披散, 幼时被糙伏毛, 以后无毛。叶片坚纸质, 卵形或椭圆形, 顶端急尖, 基部广楔形, 长 1—4 厘米, 宽 0.8—2(—3) 厘米, 全缘或具密浅细锯齿, 3—5 基出脉, 叶面通常仅边缘被糙伏毛, 有时基出脉行间被 1—2 行疏糙伏毛, 背面仅沿基部脉上被极疏糙伏毛, 侧脉互相平行; 叶柄长 2—6 毫米, 有时长达 15 毫米, 被糙伏毛。聚伞花序, 顶生, 有花 (1—) 3 朵, 基部有叶状总苞 2, 通常较叶小; 花梗长 2—10 毫米, 被糙伏毛, 上部具苞片 2; 苞片卵形, 长 2—3 毫米, 宽约 1.5 毫米, 具缘毛, 背面被糙伏毛; 花萼管长约 5 毫米, 被糙伏毛, 毛基部膨大呈圆锥状, 有时 2—3 簇生, 裂片披针形, 长 2—3 毫米, 被疏糙伏毛, 边缘具刺毛状缘毛, 裂片间具 1 小裂片, 较裂片小且短; 花瓣淡紫红色至紫红色, 菱状倒卵形, 上部略偏斜, 长 1.2—2 厘米, 宽 1—1.5 厘米, 顶端有 1 束刺毛, 被疏缘毛; 雄蕊长者药隔基部延伸, 弯曲, 末端具 2 小瘤, 花丝较伸延的药隔略短, 短者药隔不伸延, 药隔基部具 2 小瘤; 子房下位, 顶端具刺毛。果坛状球状, 平截, 近顶端略缢缩, 肉质, 不开裂, 长 7—9 毫米, 直径约 7 毫米; 宿存萼被疏糙伏毛。花期 5—7 月, 果期 7—9 月。

产贵州、湖南、广西、广东(海南岛未发现), 江西、浙江、福建。生于海拔 1250 米以下的山坡矮草丛中, 为酸性土壤常见的植物。越南也有。

果可食, 亦可酿酒; 全株供药用, 有涩肠止痢, 舒筋活血, 补血安胎, 清热燥湿等作用; 捣碎外敷可治疮、疖、疔; 根可解木薯中毒。

2. **细叶野牡丹**(海南植物志) 山公榴(海南岛), 铺地莲(榆)(广西), 水社野牡丹(台湾)

**Melastoma intermedium** Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 38: 360. 1908; Guillaum. in Lecte. Not. Syst. 2: 317. 1913 et Bull. Soc. Bot. France 60: 402. 1913; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 7. 1944 et Woody Fl. Taiwan 659. fig.