

1979—*Blastus hirsuta* H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 16. 1944, typ. specim. H. T. Tsai 54275 (err. 54257).

灌木, 高约 1 米; 茎钝四棱形, 具槽, 无毛。叶片纸质或近膜质, 广椭圆形或卵状椭圆形, 顶端短渐尖, 基部广钝或近圆形, 长 9—15 厘米, 宽 6—9 厘米, 边缘具密细齿牙, 齿尖具刺毛, 5(—7) 基出脉, 叶面被疏短刺毛及细糠秕, 褶皱, 基出脉、侧脉下凹, 背面被糠秕, 脉隆起; 叶柄长 3—7 厘米, 无毛。伞形花序, 腋生, 总梗极短, 花未详。每序有果 3—4 个; 蒴果卵状球形, 略具四棱, 直径约 5 毫米, 为宿存萼所包; 宿存萼顶端平截, 密被长硬毛及小腺点, 脉不明显, 宿存萼片广卵形, 长约 2 毫米, 边缘具缘毛, 具小突起, 果梗长约 1 厘米, 多少被长硬毛, 四棱形。花期未详, 果期约 10 月。

产云南西北部。生于海拔 2500—2800 米的林下荫湿的地方。模式标本采自云南福贡。

2. 尖叶八蕊花(云南植物志)

Sporoxeia latifolia (H. L. Li) C. Y. Wu et Y. C. Huang ex C. Chen, 云南植物志 2: 109. 1979, p. p., excl. pl. 27, 11—15 et syn. *S. fengii*—*Blastus latifolius* H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 15. 1944.

2a. 尖叶八蕊花(原变种)

var. *latifolia*

灌木, 高约 1 米; 茎钝四棱形, 以后近圆形, 分枝或不分枝, 常外倾, 幼时密被微柔毛。叶片纸质或近膜质, 卵形、广卵形至椭圆形, 顶端渐尖, 基部圆形、广钝或稀微心形, 长 11—15 厘米, 宽 5—8.5 厘米, 稀 18×11 厘米, 边缘具细密齿牙, 齿尖具短刺毛, 5(—7) 基出脉, 叶面幼时被微柔毛及疏短刺毛或糙伏毛, 以后微柔毛渐脱落, 基出脉下凹, 被微柔毛及疏短刺毛, 侧脉微凸, 背面脉隆起, 基出脉上被刺毛, 其余密被腺状鳞片; 叶柄长 3—6.5 (—8) 厘米, 密被微柔毛及刺毛(原描述被长柔毛)。伞形花序, 腋生或生于无叶叶痕上, 总梗短, 最长约 2 毫米, 被微柔毛; 苞片小, 钻形, 早落; 花梗长约 5 毫米, 密被微柔毛; 花萼钟状漏斗形, 长约 5 毫米(原描述约 3 毫米), 被微柔毛, 钝四棱形, 裂片半圆形, 顶端急尖, 长约 3 毫米(原描述约 1 毫米), 两面均被微柔毛; 花瓣卵形, 1 侧偏斜, 顶端渐尖, 基部无爪, 长约 7 毫米, 宽约 6 毫米, 多少被微柔毛; 雄蕊等长, 花丝长约 2 毫米, 花药长约 4 毫米, 基部具小疣, 药隔膨大, 基部伸延呈短距, 距长约 1 毫米; 子房坛形, 顶端具冠, 冠缘具啮蚀状细齿。蒴果近球形, 具钝四棱, 直径约 5 毫米与宿存萼近等长; 宿存萼与果同形, 被微柔毛, 具隆起的 8 脉, 萼片宿存, 果梗增长, 长 5—15 毫米。花期约 8 月, 果期约 10 月。

产云南东南部。生于海拔 1400—1900 米的疏、密林下, 荫湿处或岩石积土上。模式标本采自云南蒙自。

2b. 光萼八蕊花(变种)

var. *fengii* (S. Y. Hu) C. Chen, 植物研究, 4(3): 37. 1984—*S. fengii* S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. 33: 166. pl. 2. f. 1. 1952—*S. latifolia* (H. L.