

为多且明显;花较小,花瓣长约6毫米

.....11b.心叶野海棠(变种) *B. esquirolii* (Lévl.) Lauener var. *cordata* (H. L. Li) C. Chen

13.茎及叶柄被平展的红色长刚毛及柔毛,叶面被微柔毛及疏糙伏毛;花瓣椭圆形或长圆状卵形

.....12.红毛野海棠 *B. tuberculata* (Guillaum.) Diels

组1. 野海棠组——Sect. *Bredia*——Sect. I. *Eubredia* H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 20. 1944; Sect. II. *Tashiroea* (Matsum.) H. L. Li l. c. 12.

叶片基部楔形至圆形或心形,被毛或无毛;由聚伞花序组成松散的圆锥花序,顶生,有花10朵以上。

1. 秀丽野海棠

Bredia amoena Diels in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin 9: 197. 1924 et in Engl. Bot. Jahrb. 65: 111. 1932; Metcalf in Journ. Arn. Arb. 12: 271. 1931 et in Lingnan Sci. Journ. 12: 154. 1933——*B. chinensis* Merr. in Journ. Arn. Arb. 8: 11. 1927——*B. pricei* Metcalf in Lingnan Sci. Journ. 12: 153. 1933——*B. amoena* Diels var. *serrata* H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 21. 1944.

1a. 秀丽野海棠(原变种) 大叶活血、活血丹(浙江)

var. *amoena*

小灌木,高30—70厘米;茎圆柱形,分枝多,小枝略四棱形,幼时密被柔毛及腺毛,以后渐脱落。叶片纸质,卵形至椭圆形,顶端渐尖或急尖,具短尖头,基部圆形至广楔形,长4—10.5厘米,宽2.5—5.2厘米,全缘至具细波齿,5基出脉,近边缘两条经常不明显,两面被微柔毛或几无毛,叶面基出脉微凹,侧脉略凸,背面基出脉、侧脉隆起,细脉不明显;叶柄长8—25毫米,被微柔毛。由聚伞花序组成圆锥花序,顶生,长7—10厘米,宽2.5—5厘米,总梗、花梗及花萼均密被微柔毛及腺毛,有时花萼几无毛;花梗长约3毫米;花萼钟状漏斗形,管长约3毫米,具四棱,裂片短三角形,顶端急尖,长约1毫米;花瓣玫瑰色或紫色,长圆形,顶端渐尖,略偏斜,长约8毫米,宽约3.5毫米;雄蕊8,4长4短,长者长约13毫米,花药长6毫米,药隔下延呈短柄,短者长约9毫米,花药披针形,长约4毫米,药隔下延至花药基部前面呈不明显的小瘤,后面呈不明显的短距;子房半下位,卵状球形,顶端具4小突起,被疏腺毛。蒴果近球形,为宿存萼所包;宿存萼钟状漏斗形,具四棱,顶端平截,冠以宿存萼片,被微柔毛及腺毛或几无毛,具8脉,长约4毫米,直径约3.5毫米。花期7—8月,果期8—9月。

产湖南、江西、安徽、浙江、福建、广东(海南岛未发现)。生于海拔400—1100米的山谷、山坡疏、密林下,溪边或路旁。模式标本采自浙江温州,北雁荡山。

全株煎水内服有活血通经的作用或煎水洗,可消手脚浮肿。

本种叶缘的锯齿深浅有各种程度的不同,就是在同一植株上也是如此,故 *Bredia amoena* Diels var. *serrata* H. L. Li 不能成立。