

1b. 三数野海棠(变种)

var. *trimera* C. Chen, 植物研究, 4 (3): 38. 1984. — *B. sinensis* (Diels) H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 22. 1944, p. p. min., quoad specim. Kwangsi.

本变种与前者主要区别是, 植株较矮, 高约 25 厘米; 叶片坚纸质, 侧脉不明显; 花序长 5 厘米以下, 花较大, 3 数, 花萼管状钟形, 具三棱, 长约 7.5 毫米, 裂片三角形, 顶端锐尖, 长约 2.5 毫米。花期约 6 月, 果期未详。

产广西中部, 见于山间密林下。模式标本采自广西金秀。

2. 过路惊(江西) 图版 43: 6

Bredia quadrangularis Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 473. 1891; Metcalf in Lingnan Sci. Journ. 12: 155. 1933; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 21. 1944.

小灌木, 高 30—120 厘米; 茎圆柱形或略四棱形, 分枝多, 小枝四棱形, 棱上多少具狭翅, 无毛。叶片坚纸质, 卵形至椭圆形, 顶端短渐尖, 钝圆, 基部楔形, 长 2.5—5 厘米, 宽 1.5—2.5 厘米, 极少长 6.5 厘米, 宽 3 厘米, 边缘具疏浅锯齿或近全缘, 3 基出脉, 两面无毛, 叶面基出脉微凹, 侧脉不明显, 背面基出脉隆起, 侧脉不甚明显, 细脉不明显; 叶柄长 5—12 (—15) 毫米, 无毛。聚伞花序, 腋生于枝条顶端, 有花 3—9 朵或略多, 长 3—7 厘米, 宽约 2 厘米, 无毛; 总梗纤细, 直径不到 0.5 毫米; 苞片小, 钻形, 长 1 毫米以下; 花梗长约 5 毫米, 下弯; 花萼短钟形, 具四棱, 长约 2.5 毫米, 裂片呈浅波状, 顶端具小短尖头; 花瓣玫瑰色至紫色, 卵形, 顶端急尖, 略偏斜, 长约 5 毫米, 宽 3 毫米; 雄蕊 4 长 4 短, 长者长约 8.5 毫米, 花药披针形, 呈镰状弯曲, 长约 3.5 毫米, 药隔下延呈短柄, 短者长约 7 毫米, 花药长约 3 毫米, 基部具小瘤, 药隔下延呈短距; 子房半下位, 扁球形, 顶端具 4 个有浅裂的突起, 无毛。蒴果杯形, 四棱形, 顶端平截, 露出宿存萼外; 宿存萼浅杯形, 四棱, 顶端冠以浅波状宿存萼片, 长约 3 毫米, 直径约 4 毫米。花期 6—8 月, 果期 8—10 月。

产浙江、江西、福建。生于海拔 300—1400 米的山坡、山谷林下, 荫湿的地方或路旁。模式标本采自我国南方。

全株药用, 治小儿夜间惊哭。

A. Guillaumin (in Bull. Soc. Bot. France 60: 403. 1913) 曾记载本种分布于广东, 但我们未见标本。

3. 鸭脚茶(福建) 山落茄(浙江), 雨伞子、九节兰(福建), 中华野海棠(中国高等植物图鉴) 图版 44: 1—2

Bredia sinensis (Diels) H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 22. 1944, excl. pl. Kwangsi.; 中国高等植物图鉴 2: 1006. 图 3742. 1972 — *Tashiroea sinensis* Diels in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin 9: 198. 1924 et in Engl. Bot. Jahrb. 65: 100. 1932 — *B. glabra* Merr. in Journ. Arn. Arb. 8: 12. 1927; Metcalf in Lingnan Sci. Journ. 12: 155. 1933.



1—5. 叶底红 *Phyllagathis fordii* (Hance) C. Chen, var. *fordii*: 1. 果枝, 2. 花 (去花瓣), 3. 花瓣, 4. 果, 5. 花萼上的毛。6. 过路惊 *Bredia quadrangularis* Cogn.: 果枝。7—10. 短柄野海棠 *B. sessilifolia* H. L. Li: 7. 花枝, 8. 花 (去花瓣), 9. 花瓣, 10. 叶片 (另一种叶形)。(曾孝濂绘)