

灌木，高 60—100 厘米；茎圆柱形，分枝多，小枝略四棱形，幼时被星状毛，以后无毛或被疏微柔毛。叶片坚纸质，披针形至卵形或椭圆形，顶端渐尖，钝，基部楔形或极钝，长 5—11 厘米，宽 2—5 厘米，稀长 13 厘米，宽 6 厘米，近全缘或具疏浅锯齿，5 基出脉，幼时两面被星状毛，以后几无毛，叶面基出脉微凹，侧脉不明显，背面基出脉隆起，侧脉、细脉均不明显；叶柄长 5—16(—20) 毫米，几无毛。聚伞花序，顶生，有花 (5—) 20 朵，长和宽 4—6 厘米，几无毛或节上被星状毛；苞片早落，花梗长 5—8 毫米，多少被微柔毛；花萼钟状漏斗形，长约 6 毫米，具四棱，有时多少被星状毛，裂片极浅，圆齿状，顶端点尖；花瓣粉红色至紫色，长圆形，顶端急尖，1 侧偏斜，长约 1 厘米，宽 6 毫米；雄蕊 4 长 4 短，长者长约 16 毫米；花药披针形，长约 1 厘米，药隔下延呈短柄，短者长约 1 厘米，花药长约 7 毫米，基部具小瘤，药隔下延呈短距；子房半下位，卵状球形，顶端被微柔毛。蒴果近球形，为宿存萼所包；宿存萼钟状漏斗形，具四棱，顶端平截，冠以宿存萼片，萼片有时被星状毛，长和直径约 7 毫米。花期 6—7 月，果期 8—10 月。

产浙江、江西、广东(海南岛未发现)、福建。生于海拔 400—1200 米的山谷、山坡林下，荫湿的路边、沟旁草丛中或岩石积土上。模式标本采自福建崇安。

全株供药用，叶煎水洗身可治感冒；根与猪脑煎服治头痛或疟疾，与猪腰煎水冲酒服治腰痛。

4. 短柄野海棠 水牡丹(广西) 图版 43: 7—10

Bredia sessilifolia H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 22. 1944.

灌木，高 20—100 厘米；茎圆柱形或几四棱形，分枝多，小枝近四棱形，无毛。叶片坚纸质，卵形至椭圆形，顶端渐尖，有时钝，基部圆形至微心形，长 5.5—14 厘米，宽 2.8—5 厘米，稀长 17 厘米，宽 6.5 厘米，或长 12.5 厘米，宽 7 厘米，全缘或微微具细齿，5 基出脉，有时中间的 1 对脉离基约 5 毫米，两面无毛或幼时被极细的微柔毛，叶面基出脉平整，脉间具极疏的短刺毛 1 行，侧脉不明显，背面基出脉隆起，侧脉及细脉均不明显；叶柄无或极短。聚伞花序，顶生，有花 3—5(—15) 朵，长 3—6.5 厘米，无毛；苞片钻形，早落，花梗长约 4 毫米，无毛；花萼钟状漏斗形，长约 3.5 毫米，具四棱，裂片浅圆齿状，顶端具小尖头；花瓣粉红色，长圆形或近圆形，顶端短急尖，1 侧略偏斜，长约 8 毫米，宽 4.5—6 毫米；雄蕊 4 长 4 短，长者长 15 毫米，花药线状披针形，长约 6 毫米，药隔下延呈短柄，短者长约 11 毫米，花药披针形，长约 5 毫米，基部具小瘤，药隔下延呈短距；子房半下位，卵状球形，顶端具数条腺毛。蒴果近球形，为宿存萼所包；宿存萼钟状漏斗形，四棱形，顶端平截，冠以宿存萼片，长和直径约 5 毫米。花期 6—7 月，果期 7—8 月。

产贵州、广西、广东(海南岛未发现)。生于海拔 800—1200 米的山谷、山坡或山脚林下，荫湿的地方，水边或岩石积土上。模式标本采自广西上思，十万大山。

5. 金石榴(台湾)

Bredia oldhamii Hook. f. in Icon. Pl. 11: 68. t. 1085. 1871; Hayata Icon.



1—5. 叶底红 *Phyllagathis fordii* (Hance) C. Chen, var. *fordii*: 1.果枝, 2.花(去花瓣), 3.花瓣, 4.果, 5.花萼上的毛。6. 过路惊 *Bredia quadrangularis* Cogn.: 果枝。7—10. 短柄野海棠 *B. sessilifolia* H. L. Li: 7.花枝, 8.花(去花瓣), 9.花瓣, 10.叶片(另一种叶形)。(曾孝濂绘)