

麻叶

var. **cordata** (H. L. Li) C. Chen, 植物研究, 4(3): 40. 1984.——*Bredia cordata* H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 24. 1944.

本变种与前者区别是, 本变种小枝被微柔毛; 叶片通常较小, 长3—6厘米, 宽1.7—3.5厘米; 叶面被极疏的糙伏毛, 背面被微柔毛, 以脉上为多且明显; 花较小, 花瓣长约6毫米, 雄蕊长者长约11毫米等可以区别。花期6—8月, 果期9—10月。

产四川(西北部至西部)。生于海拔约600米的山坡林下湿润的地方, 或林缘草丛中。模式标本采自四川雅安。

全株供药用, 用于刀伤止血。

12. 红毛野海棠(云南植物志)

Bredia tuberculata (Guillaum.) Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 111. 1932; Turr. in Curtis's Bot. Mag. 166: t. 49. 1949, quoad plant. Yunnan. et Szechuan.; 云南植物志 2: 106. 1979——*Fordiophyton tuberculatum* Guillaum. in Le cte. Not. Syst. 2: 326. 1913 et in Bull. Soc. Bot. France 60: 404. 1913——*B. omeiensis* H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 24. 1944.

直立草本或亚灌木, 高30—60厘米; 茎四棱形, 浅棕色或红色, 被平展的红色长刚毛、腺毛及柔毛; 通常不分枝。叶片纸质, 广卵形至椭圆形, 顶端渐尖, 基部心形, 长5—7.5厘米, 宽3—5厘米, 稀长达11.5厘米, 宽达7.3厘米, 边缘具大小不等的密细齿, 齿尖具红色长刚毛, 具长刚毛状缘毛, 5—7出脉, 叶面被疏糙伏毛及微柔毛, 有时有白色斑点, 基出脉微凹, 侧脉不明显, 背面红紫色, 仅脉上被疏糙伏毛及微柔毛, 其余无毛, 基出脉、侧脉明显, 隆起, 细脉网状; 叶柄长2.5—6.5厘米, 密被平展的红色长刚毛及微柔毛。伞状聚伞花序, 顶生或生于分枝顶端, 有花达8朵, 稀10—12朵; 苞片小, 线形或线状披针形; 花梗长5—10毫米; 花萼杯形, 管长约7毫米, 带红色, 裂片4, 狭披针形或披针形, 反卷, 3—5毫米, 里面被细腺点状微柔毛; 花瓣4, 粉红色至紫红色, 椭圆形或长圆状卵形, 顶端急尖, 长7—11毫米, 无毛; 雄蕊8, 4长4短, 长者长约21毫米, 花药披针形, 微弯, 长约7毫米, 前面无小瘤, 药隔基部不膨大或微微膨大, 但不成距, 短者长约11毫米, 花药短披针形, 长约5毫米, 药隔向前伸延呈小瘤, 向后膨大成1短距; 子房半下位, 卵形, 顶端具膜质冠, 檐部边缘具1环缘毛, 花柱常带红色。蒴果杯形, 为宿存萼所包; 宿存萼通常为浅紫红色, 被平展的红色长刚毛、腺毛和微柔毛, 长约4毫米, 直径约5毫米, 膜质冠露出萼外。花期7—8月, 果期约10月。

产云南、四川。生于海拔750—1200米的坡地, 湿润的草丛中或水旁、林缘荫处。模式标本采自云南盐津(成凤山)。

13. 云南野海棠(云南植物志)

Bredia yunnanensis (Lévl.) Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 111. 1932;