

约 6.5 毫米,顶端渐尖,长约 14 毫米,宽约 8 毫米;雄蕊等长,花丝长约 7 毫米,花药披针形,长约 1 厘米,药隔膨大,下延向前呈小瘤,向后成短距;子房卵形,顶端具冠,4 裂,边缘具腺毛。蒴果杯形,四棱形,顶端平截,长约 7 毫米,直径约 6 毫米,为宿存萼所包,顶端微伸出萼外;宿存萼具 8 纵肋;果柄长达 2.3 厘米。花期 5—7 月,果期 7 月以后。

产广西、广东。见于山谷,林下荫湿的地方,于溪边、路旁石缝间。越南(北部)也有。模式标本采自广西十万大山。

5b. 毛萼锦香草 (变种)

var. setotuba C. Chen, 植物研究, 4(3): 44. 1984.

本变种与前者主要区别是,花萼密被扭曲的刺毛,萼片顶端钝。

产广东(西南部)。生于海拔约 960 米的山谷,林下,水边或路旁荫处石缝间。模式标本采自广东阳江。

6. 窄叶锦香草 (海南植物志)

Phyllagathis stenophylla H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 32. 1944; 海南植物志 2: 32. 1965.

灌木,高 0.8—3 米;茎圆柱形,微四棱形,具 4 纵肋;小枝无毛,四棱形,棱上具肋。叶片坚纸质,长圆状披针形至长圆状倒披针形,顶端渐尖或短渐尖,基部楔形,长 5—10 厘米,宽 1—2.3 厘米,全缘或中部以上具细锯齿,3 基出脉,两面无毛,叶面基出脉及侧脉微隆起,背面脉均隆起,明显;叶柄长 5—10 毫米,无毛。聚伞花序紧缩呈伞形花序,顶生,有花 (2—)3 朵,总梗有时长约 4 毫米;苞片叶状,披针形,较叶小;花梗长 5—8 毫米,四棱形,无毛;花萼钟状漏斗形,四棱形,管长 5—6.5 毫米,裂片狭三角形,顶端渐尖,长约 1 毫米;花瓣玫瑰色或淡红紫色,卵形,略偏斜,顶端渐尖,长约 12 毫米,宽约 6 毫米;雄蕊等长,花丝长约 7 毫米,花药钻状披针形,长约 6 毫米,药隔膨大,下延呈短柄,前面略膨大,后面呈短距;子房卵形,顶端具 4 裂,裂片具 2 小齿。蒴果杯形,四棱形,顶端平截,长约 6 毫米,直径约 5 毫米,下部为宿存萼所包;宿存萼具 8 纵肋;果柄长约 1.5 厘米。花期 5—8 月,果期 8—10 月。

产广东(仅海南岛)。生于海拔 500—920 米的山谷,疏、密林下,溪边水旁石缝间。模式标本采自广东海南岛崖县。

皮含单宁。

7. 偏斜锦香草 水角风 (湖南) 图版 45: 1—3

Phyllagathis plagiopetala C. Chen, 植物研究, 4(3): 44. 1984.

亚灌木,高 30—40 厘米,具地下走茎;茎四棱形,有槽,幼时被微柔毛,以后无毛,基部木质化。叶片纸质或坚纸质,下部的常为广椭圆形,上部的卵形,顶端渐尖或急尖,基部楔形或广钝,极罕浅心形,长 5—12.5 厘米,宽 3—6.5 厘米,边缘近全缘,具细缘毛,有时具细锯齿,齿具刺毛,5—7 基出脉,近边缘的 1 对不明显,中间的 1 对离基约 7 毫米,有时达