

2 厘米,两面被微柔毛,以后叶面尚杂有极疏的短糙伏毛,基出脉微凹,其余脉平整,背面基出脉及侧脉隆起,明显;叶柄长 0.8—4(—5.2) 厘米,被微柔毛。聚伞状伞形花序顶生,有时腋生,总梗长 0.5—3 厘米,与花梗、花萼被微柔毛,花梗长约 1 厘米;花萼钟状漏斗形,管长约 6 毫米,具 8 脉,四棱形,裂片披针形,顶端渐尖,长约 5 毫米,里外被微柔毛,反折;花瓣粉红色、红色或紫色,广倒卵形,顶端急尖,1 侧偏斜,上方突出 1 小片,长约 7 毫米,宽约 5 毫米;雄蕊同型,近等长,长 11—13 厘米,花药长约 7 毫米,基部具小瘤,药隔下延呈短距,二者有时合成盘状;子房卵形,顶端具膜质冠,冠 4 裂,具糠秕状缘毛。蒴果杯形,顶端平截,冠木栓化,露出萼外约 1.5 毫米;宿存萼与果同型,长宽约 4 毫米,萼片宿存。花期约 7 月,果期 10 月以后。

产湖南南部及广西东北部。生于海拔 800—1200 米的山地、山谷疏、密林下或沟边。模式标本采自广西全州。

8. 毛锦香草 (海南植物志)

Phyllagathis melastomatoides (Merr. et Chun) Ko, 植物分类学报 8: 267. 1963; 海南植物志 2: 32. 图 305. 1965——*Osbeckia melastomatoides* Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 295. pl. 65. 1935; H. L. Li in Journ Arn. Arb. 25: 6. 1944.

8a. 毛锦香草 (原变种)

var. *melastomatoides*

小灌木,高约 1 米;茎圆柱形,节通常膨大,分枝多,小枝密被紧贴的刺毛,以后无毛。叶片坚纸质或纸质,长圆形、长圆状椭圆形或长圆状卵形,顶端短渐尖或渐尖,基部楔形,长 6—14 厘米,宽 2—6 厘米,边缘具细锯齿,齿尖具刺毛,5—7 基出脉,7 基出脉时,最外侧的 1 对极近边缘,叶面密布细泡状突起,基出脉微凹,脉间具 1 行疏刺毛,侧脉微隆起,背面基出脉、侧脉隆起,被紧贴的疏刺毛,有时细脉具极少的刺毛;叶柄长 1—5(—10) 厘米,密被紧贴的刺毛。聚伞花序,常 1(—3) 花,生于小枝顶端叶腋,总梗短,长约 2 毫米,与花梗、花萼均被紧贴的刺毛;苞片披针形,顶端长渐尖,长约 4 毫米;花瓣红色或玫瑰色,倒卵形,1 侧偏斜,顶端圆形,上半部具腺状缘毛,长约 14 毫米,宽约 9 毫米;雄蕊等长,花丝长约 7 毫米,花药披针形,长约 7 毫米,药隔膨大,下延向前成小瘤,向后成短距;子房半下位,卵形,顶端具腺毛。蒴果杯形,四棱形,顶端平截,4 裂,长约 7 毫米,直径约 5 毫米,下部为宿存萼所包;宿存萼具 8 纵肋;果柄长 12—18 毫米。花期 10—12 月,果期 12 月至翌年 2 月。

产广东(仅海南岛)。生于山谷溪边。模式标本采自广东海南岛定安。

8b. 短柄毛锦香草 (海南植物志)(变种)

var. *brevipes* Ko, 植物分类学报 8: 268. 1963; 海南植物志 2: 33. 1965.

本变种与前者主要区别是,果梗较短,长 8 毫米以下,小枝及叶柄毛较粗且密。

产广东(仅海南岛)。生于山谷、溪边。模式标本采自广东海南岛陵水。