

尖,长不到1毫米;花瓣紫红色或紫色,广卵形,顶端渐尖,偏斜,长约7毫米,宽5毫米;雄蕊4长4短,花药直立,基部具小瘤,药隔下延呈短距,长者长9.5—11.5毫米,花药长4.5—6毫米,短者长8.5—9.5毫米,花药长3.5—4.5毫米;子房半下位,卵形,顶端具膜质冠,冠缘具腺毛。果未详。花期8—9月。

产湖南南部。生于海拔1100—1300米的山坡、山谷密林下,路旁或灌丛中,荫湿和土质肥沃的地方。模式标本采自湖南武岗云山。

20. 大叶熊巴掌

Phyllagathis longiradiosa (C. Chen) C. Chen, 植物研究, 4(3): 51. 1984. —*Barthea cavaleriei* Lév. in Fedde Repert. Sp. Nov. 8: 16. 1910, quoad specim. J. Cavalerie 1552; Lév. Fl. Kouy-Tchéou 276. 1914—*Fordiophyton cavaleriei* (Lév.) Guillaum. in Bull. Soc. Bot. France 60: 275. 1913, p. p. quoad specim. e Kweichow.—*F. cavaleriei* (Lév.) Guillaum. var. *violacea* Lév. Cat. Pl. Yun-Nan 176. 1916, nom. nud.—*Bredia cavaleriei* (Lév.) Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 110. 1932, quoad typum [non Lév. et Van. in Mem. Soc. Nat. Sci. Nat. Math. Cherbourg 35: 396. 1906 et in Fedde Repert. Nov. Sp. 4: 94. 1907 (= *F. faberi* Stapf)]—*Br. esquirolii* (Lév.) Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 31: 398. 1972, p. p. quoad specim. J. Cavalerie 1552—*Br. longiradiosa* C. Chen, 云南植物志 2: 105. 图 27, 1—5. 1979.

20a. 大叶熊巴掌 (原变种) 图版 42: 1—5

大叶野海棠(云南植物志)

var. *longiradiosa*

草本或小灌木,高30—100厘米;茎上部近肉质,圆柱形,具不明显的棱,近无毛或被疏长柔毛,不分枝。叶片纸质或近膜质,广卵形或近椭圆形,顶端渐尖,基部心形,长11—23厘米,宽7—13厘米,边缘具微细齿或几全缘,具缘毛,7基出脉,但有1对脉常离基部5—14毫米,叶面绿色,密被细糠秕及疏短糙伏毛,基出脉、侧脉微凹,背面通常紫红色,密被糠秕及微柔毛,基出脉、侧脉隆起,明显;叶柄长3—8.5厘米,具槽,槽两侧具长柔毛,其余几无毛。伞形花序,顶生,总梗长2—4厘米,果时增长达6厘米,被微柔毛及疏长柔毛,花梗长约1厘米,被微柔毛;花萼长约1厘米,被基部膨大的肉质刺毛,裂片扁圆形,顶端微凹,长约2毫米,外面被疏刺毛,里面被微柔毛;花瓣玫瑰红色,广卵形,顶端微凹,具缘毛,其余无毛,长约4毫米,宽约5毫米;雄蕊近等长,花药基部有2小瘤,药隔基部膨大成短距;子房卵形,顶端具膜质冠,冠檐部具1环缘毛。蒴果顶端膜质冠微露出宿存萼外;宿存萼长约6毫米,直径约8毫米,被基部膨大的肉质刺毛。花期6—7月,果期12月至翌年1月。

产云南东南部及碧江、贵州、广西。生于海拔300—2200米的阔叶林下。模式标本采