

米,被微柔毛及疏刺毛,裂片广卵形,长宽约2毫米,顶端急尖,具刺毛状疏缘毛,两面无毛;花瓣白色(据野外记录),雄蕊8,同形,等长,长约12毫米,花药披针形,不弯曲,长约6毫米,基部具2弯刺状突起,药隔基部下延,膨大呈小瘤状,中间具槽;子房卵形,顶端膜质冠4裂,边缘具腺状缘毛。蒴果杯形,顶端冠木质化,边缘具细齿,宿存萼长约5毫米,直径约4毫米,被微柔毛及疏刺毛,宿存萼片广卵形。 花果期约9月。

产湖北。生于海拔约350米的山脚大岩壁荫处。模式标本采自湖北合丰。

本种与长芒锦香草 *P. longearistata* C. Chen 相近,但叶片背面密布小泡状突起,基出脉及侧脉被微柔毛,近边缘被疏糙伏毛;萼片较大,长约4毫米,可以区别。

系2. 葶花系——*Ser. Longiscapae* C. Chen, 植物研究, 4(3): 54. 1984.

草本,茎较短,长20厘米以下,花序总梗长,长4—15(—20)厘米。

23. 斑叶锦香草 图版 41: 4—5

Phyllagathis scorpiothyrsoides C. Chen, 植物研究, 4(3): 55. 1984.——*Scorpiothyrsus xanthostictus* auct. non (Merr. et Chun) H. L. Li: Ko, 植物分类学报 8: 268. 1963; 海南植物志 2: 33. 1965, p. p. min. quoad pl. Fangcheng.


草本,高约20厘米;茎四棱形或六棱形,具匍匐茎,逐节生根,不分枝,全株均被糠秕。叶片坚纸质,广椭圆形至卵形,顶端急尖,基部心形或浅心形,长7—10厘米,宽5.2—8.8厘米,边缘具极不明显的细锯齿,7基出脉,近边缘两条不甚明显,叶面脉平整,基出脉间具1行白黄色圆形或近椭圆形斑点,有时无,背面基出脉及侧脉隆起;叶柄长3.5—6.5厘米。伞形花序,顶生,总梗长约6.5厘米,苞片披针形,长约6毫米,宽约1.7毫米,具白黄色圆形或近椭圆形斑点或无点;花未详,果梗长约8毫米,四棱形,蒴果杯形,为宿存萼所包,顶端具冠;宿存萼杯状钟形,具疏三角形短刺毛,四棱形,长约6毫米,直径5毫米。花期未详,果期约7月。

产广西西南部。生于山谷、山坡林中,荫湿的地方。越南北部也有。模式标本采自广西十万大山。

24. 四蕊熊巴掌 (云南植物志) 图版 47: 6—7

Phyllagathis tetrandra Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 116. 1932, sp. sensu prop. rest.; 云南植物志 2: 112. 图 28, 6—7. 1979——*Stapfiophyton tetrandrum* (Diels) H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 29. 1944.

草本,具匍匐短茎,逐节生根,节常膨大,密被锈色刺毛(或刚毛),四棱形。叶片纸质或近坚纸质,椭圆形或卵形,稀近圆形,顶端急尖、钝或微凹,基部心形,长6.5—12.5厘米,宽5.5—9.5(—10.5)厘米,全缘,7基出脉,两面被糠秕状微柔毛,叶面基出脉明显,微凹,侧脉不甚明显,多数,背面基出脉有时被极疏的刺毛,基出脉、侧脉隆起;叶柄长5—9厘米,稀达14厘米,被糠秕状微柔毛及疏刺毛。伞形花序或伞房花序,顶生,单1或稀具有



1.七脉偏瓣花 *Plagiopetalum esquirolii* (Lévl.) Rehd. var. *septemnervium* C. Chen:果枝。
2—3.短柄柏拉木 *Blastus brevissimus* C. Chen: 2.花果枝, 3.花。4—5.斑叶锦香草 *Phyllagathis scorpiothyrsoides* C. Chen: 4.果枝, 5.果。(肖溶绘)