

delicata C. B. Robins. in Bull. Torr. Bot. Club 35: 72, 75. 1908; Hayata Icon. Pl. Formos. 3: 124. 1913; Merr. et Chun in Sunyatsenia 5: 144. 1940; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 26. 1944; H. Keng in Quart. Journ. Taiwan Mus. 8: 35. 1955; 中国高等植物图鉴 2: 1008. 1972; quoad pl. Taiwan.; H. Keng et H. L. Li in Fl. Taiwan 3: 865. pl. 845. 1977 — *S. nepalensis* auct. non Wall.; Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 25(19): 98. 1908 (Fl. Mont. Formos.) et Icon. Formos 2: 24. 1912; Hansen in Bot. Tidsskrift 73(3—4): 180. 1980, p. p., cum ic. opt.

本变种与前者主要区别是，叶通常较小，长1—1.5厘米，宽0.7—1.2厘米或长可达5厘米，宽2.5厘米；花大，萼管长约5毫米，萼片三角形，长1.5毫米，边缘具2—3条裂，裂片长约1.5毫米；花瓣长7—8毫米，椭圆形。

产我国福建、台湾，见于中海拔地区密林下。菲律宾也有。

2. 楮头红(中国高等植物图鉴)

Sarcopyramis nepalensis Wall. Tent. Fl. Nepal. 32. t. 23. 1826; Triana in Trans. Linn. Soc. 28: 77. t. 6, f. 74a. 1871; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 541. 1879; Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 517. 1871; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 25. 1944, p. p. maj., excl. syn. *S. bodinieri* et *S. nepalensis* var. *bodinieri*; S. Y. Hu l. c. 33: 173. 1952; Kitam. in Kihara Faur. Fl. Nep. Himal. 1: 185. 1955; 中国高等植物图鉴 2: 1007. 图 3744. 1972; 云南植物志 2: 120. 图版 29, 9—12. 1979; Hansen in Bot. Tidsskrift 73(3—4): 180. 1980, p. p., excl. p. p. syn. — *S. lanceolata* Wall. Cat. no. 6290. 1830, nom. nud.; Benn. Pl. Jav. Rar. 214. 1844; Triana l. c. t. 6, fig. 74b; Hance in Journ. Bot. 16: 107. 1878 — *S. grandiflora* Griff. in Notul. Pl. Asiat. 4: 678. 1852 et Icon. Pl. Asiat. t. 639. 1854 — *Phyllagathis chinensis* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 38: 360. 1908 — *S. dielsii* Hu, 静生生物调查所汇报 7: 216. 1936.

2a. 楮头红(原变种) 图版 49: 9—12

var. *nepalensis*

直立草本，高10—30厘米；茎四棱形，肉质，无毛，上部分枝。叶膜质，广卵形或卵形，稀近披针形，顶端渐尖，基部楔形或近圆形，微下延，长(2—)5—10厘米，宽(1—)2.5—4.5厘米，边缘具细锯齿，3—5基出脉，叶面被疏糙伏毛，基出脉微凹，侧脉微隆起，背面被微柔毛或几无毛，基出脉、侧脉隆起；叶柄长(0.8—)1.2—2.8厘米，具狭翅。聚伞花序，生于分枝顶端，有花1—3朵，基部具2枚叶状苞片，苞片卵形，近无柄；花梗长2—6毫米，四棱形，棱上具狭翅；花萼长约5毫米，四棱形，棱上有狭翅，裂片顶端平截，具流苏