

状长缘毛膜质的盘;花瓣粉红色,倒卵形,顶端平截,偏斜,另1侧具小尖头,长约7毫米;雄蕊等长,花丝向下渐宽,花药长为花丝的1/2,药隔基部下延成极短的距或微突起,距长为药室长的1/4—1/3,上弯;子房顶端具膜质冠,冠缘浅波状,微4裂。蒴果杯形,具四棱,膜质冠伸出萼1倍;宿存萼及裂片与花时同。花期8—10月,果期9—12月。

产西藏、云南、四川、贵州、湖北、湖南、广西、广东(海南岛未发现)、江西、福建。生于海拔1300—3200米的密林下荫湿的地方或溪边。尼泊尔、缅甸至马来西亚等也有。

全草入药,有清肝明目的作用,治耳鸣及目雾等症或祛肝火。

2b. 斑点栳头红(变种)

var. *maculata* C. Y. Wu ex C. Chen, 云南植物志 2: 121. 1979——*S. nepalensis* auct. non Wall.; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 25. 1944, p. p. min., quoad specim. C. W. Wang 67119.

本变种与前者主要区别是,叶面毛的基部具白色小圆斑点。果期11—12月或翌年1月。

产云南。生于海拔1000—2300米的林下湿润处或溪边。模式标本采自云南贡山。

3. 圆齿肉穗草(云南植物志)

Sarcopyramis crenata H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 26. 1944; 云南植物志 2: 121. 1979——*S. nepalensis* auct. non Wall.; Hansen in Bot. Tidsskrift 73(3—4): 180. 1980, p. p.

细弱草本,高可达7厘米,直立或近平卧,全株无毛;茎无分枝,四棱形,棱上略具狭翅。叶片几膜质,卵形至近圆形,顶端钝或近圆形,基部广楔形或近圆形,长宽1厘米或长8—14毫米,宽6—11毫米,边缘具圆齿,中脉于叶面微凹,背面微隆起,侧脉不明显;叶柄长3—5毫米,纤细。花未详。果顶生或腋生,单1,果梗长5—10毫米,具四棱;蒴果未成熟,杯形,具四棱,长约2.5毫米,宽5毫米,宿存萼片横长圆形至卵状横长圆形,膜质,顶端平截,长约2毫米,宽达4毫米。花期约3月。

产云南。生于海拔约1950米的山谷。模式标本采自云南镇康。

本种除植株较矮小及无毛外,萼片横宽与本属其他种极易区别。

4. 小叶肉穗草

Sarcopyramis parvifolia Merr. ex H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 26. 1944——*S. nepalensis* auct. non Wall.; Hansen in Bot. Tidsskrift 73 (3—4): 180. 1980, p. p.

矮小草本,高约5厘米,匍匐上升,具走茎,逐节生根,无分枝,四棱形,无毛。叶片纸质或近膜质,卵形或近圆形,稀圆形,顶端极钝,基部圆形,长0.5—1.1厘米,宽5—8毫米,边缘具细锯齿,3基出脉,叶面被疏糙伏毛,中脉微凹,其余脉不明显,背面基出脉微

隆起,被极疏糙伏毛,其余脉不明显,被疏小鳞片;叶柄长2—4毫米。聚伞花序,顶生,有花3—5朵,基部通常有苞片4或6枚;苞片圆形或倒卵形,长2—4毫米;总花柄长1—2厘米或略短,花梗极短;花萼杯状漏斗形,长约3毫米,四棱形,无毛,裂片与萼管垂直,背部具刺状尖头;花瓣粉红色或淡黄色?长圆形或倒卵形,1侧偏斜,长4—6毫米,宽约3毫米,顶端急尖,具刺状尖头;雄蕊同型,长约1.2毫米,花药倒卵形,长约0.5毫米,药隔伸延成短距,向上弯;子房卵形,顶端具不明显的膜质边缘。果未详。花期约6月。

产广西,见于密林下,岩石积土上。模式标本采自广西上思十万大山。

17. 虎颜花属——*Tigridiopalma* C. Chen

C. Chen in Act. Bot. Yunnan. 1: 106. 1979.

草本,茎及叶通常被毛,具匍匐茎,基部略木质化,直立茎极短。叶片通常膜质,边缘具细齿,基出脉9,侧脉互相平行,与基出脉垂直;具叶柄。蝎尾状聚伞花序腋生,具长总花梗(即花葶);花5枚,花萼漏斗形,具5棱,棱上常具狭翅,顶端平截,裂片短,具点尖;花瓣通常为倒卵形,1侧偏斜,顶端点尖;雄蕊10,同形,5长5短,弯曲;花丝丝状;花药线形,单孔开裂,药隔微膨大,长者药隔下延成短柄,末端前方具2小瘤,后方微隆起;短者花药基部具2小瘤,药隔下延成短距;子房卵形,上位,顶端具膜质冠,通常5裂,胚珠多数,呈纵向5束排列,特立中央胎座。蒴果漏斗状杯形,顶端平截,5裂,冠木质化,伸出宿存萼外;宿存萼与果同形,具5棱,棱上具翅;种子小,楔形,密布小突起。

为我国特有属,1种,分布于广东南部。

1. 虎颜花 大莲蓬、熊掌(广东) 图版50: 1—4

Tigridiopalma magnifica C. Chen in Act. Bot. Yunnan 1: 107. 1979.

草本,茎极短,被红色粗硬毛,具粗短的根状茎,长约6厘米,略木质化。叶基生,叶片膜质,心形,顶端近圆形,基部心形,长宽20—30厘米或更大,边缘具不整齐的啮蚀状细齿,具缘毛,基出脉9,叶面无毛,基出脉平整,侧脉及细脉微隆起,背面密被糠秕,脉均隆起,明显,被红色长柔毛及微柔毛;叶柄圆柱形,肉质,长10—17厘米或更长,被红色粗硬毛,具槽。蝎尾状聚伞花序腋生,具长总梗(即花葶),长24—30厘米,无毛,钝四棱形;苞片极小,早落;花梗具棱,棱上具狭翅,多少被糠秕,长8—10毫米,有时具节;花萼漏斗状杯形,无毛,具5棱,棱上具皱波状狭翅,顶端平截,萼片极短,三角状半圆形,顶端点尖,着生于翅顶端;花瓣暗红色,广倒卵形,1侧偏斜,几成菱形,顶端平,斜,具小尖头,长约10毫米,宽约6毫米;雄蕊长者长约18毫米,花药长约11毫米,药隔下延成长约1毫米的短柄,柄基部前方具2小瘤,后方微具三角形短距,短者长12—14毫米,花药长7—8毫米,基部具2小疣,药隔下延成短距;子房卵形,顶端具膜质冠,5裂,裂片边缘具缘毛。蒴果漏斗状杯形,顶端平截,孔裂,膜质冠木栓化,5裂,边缘具不规则的细齿,伸出宿存萼外;