

全株外敷可治枪弹伤。

5. 小蜂斗草 地胆(植物名实图考) 图版 53: 7

Sonerila laeta Stapf in Kew Bull. 73. 1906; Guillaum. in Bull. Soc. Bot. France 60: 404. 1913—*S. picta* auct. non Korth; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 36. 1944; 云南植物志 2: 123. 图版 30, 7. 1979.

小灌木或亚灌木, 高 15—30 厘米; 茎幼时四棱形, 有槽, 密被柔毛及疏腺点, 以后近圆柱形, 被微柔毛, 具分枝或不分枝, 具匍匐茎。叶片纸质或近膜质, 椭圆形或卵状椭圆形, 稀为披针形, 顶端短渐尖, 基部楔形, 有时微偏斜, 长 5—10 厘米, 宽 2—4 厘米, 有时长达 14 厘米, 边缘具细密锯齿, 齿具短尖头, 叶面被星散的紧贴短刺毛, 毛基部具圆形或椭圆形白色斑点, 中脉微凹, 侧脉约 3 对, 平整, 背面有时紫红色, 被微柔毛及糠秕, 脉上具星散的短刺毛, 中、侧脉隆起, 明显; 叶柄长 5—30 毫米, 密被柔毛及疏短刺毛。蝎尾状聚伞花序, 顶生, 有 2—7 朵花, 稀 13 朵, 长 1.5—3.5 厘米, 几无毛; 总梗四棱形, 棱上微微具翅, 花梗长约 3 毫米, 三棱形, 有极少的腺毛及狭翅; 花萼钟状管形, 长约 5 毫米, 被疏糠秕及星散腺毛, 具三棱, 具 6 脉, 其中棱上的 3 脉下延呈狭翅, 裂片短, 卵状广三角形, 长不到 1 毫米, 顶端点尖, 具缘毛; 花瓣紫红色或红色, 卵状长圆形, 1 侧偏斜, 长约 5 毫米, 顶端急尖, 外面中脉具星散腺毛; 雄蕊 3, 等长, 常偏向 1 侧, 花丝与花药等长, 花药长约 7 毫米, 基部叉开, 药隔不延长; 子房瓶形, 顶端平截, 膜质冠 3 裂。蒴果倒圆锥形或管状倒圆锥形, 略具三棱, 长 6—8 毫米, 檐部直径 4—6 毫米, 3 纵裂, 与宿存萼贴生; 宿存萼无毛, 具 6 脉。 花期 9—10 月, 果期约 12 月。

产云南南部及东南部。生于海拔 150—1300 米的山谷密、疏林下, 荫湿的地方及沟边。

本种系以 E. H. Wilson 在我国收集的种子播出的植株为模式标本, 而种子采自我何国何处未详。李惠林及《云南植物志》第二卷中, 均误将本种作 *S. picta* Korth., 其实二者最明显的区别是, 后者沿中脉及侧脉(或掌状脉)具狭长的斑纹, 非脉间毛基部具圆形的斑点。

6. 蜂斗草(中国高等植物图鉴)

Sonerila cantonensis Stapf in Ann. Bot. 6: 302. 1892; Guillaum. in Bull. Soc. Bot. France 60: 369, in clav., 344. et 404. nom. tantum 1913 et in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 914. 1921; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 138. 1927; Hand.-Mazz. in Sinensia 3: 197. 1933, fl. descrip. add.; S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. 33: 173. 1952; 中国高等植物图鉴 2: 1010. 图 3749. 1972; 云南植物志 125. 1979.

6a. 蜂斗草(原变种) 四大天王、桑勒草(广西), 尖尾痧、喉痧药(广东)

var. **cantonensis**