

2 种, 分布印度、我国至马来西亚等地。我国 1 种, 分布于广东(仅海南岛)。

1. 藤牡丹(海南植物志) 图版 52: 5—6

Diplectria barbata (Wall. ex C. B. Clarke) Franken et Roos in Blumea 24: 415. fig. 3, A. 1978——*Melastoma barbatum* Wall. Cat. n. 4082. 1831, nom. nud. ——*Anplectrum barbatum* Triana in Trans. Linn. Soc. 28: 84. 1871, nom. nud.; ex C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 256. 1879; Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 566. 1891——*Backeria barbata* Raizada in Ind. For. 94: 435. 1968——*Anplectrum glaucum* auct. non Triana; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 545. 1879, p. p.; Guillaum. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 869. 1921, pro t. 96: f. 1, 2, p. 918, t. 100 pro text.; Merr. & Chun in Sunyatsenia 5: 144. 1940; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 37. 1944; 海南植物志 2: 36. 图 308. 1965.

攀援灌木或藤本, 长 3—4 米; 幼枝钝四棱形, 被疏星状毛, 以后近圆柱形, 无毛, 空心, 节上环纹明显。叶片坚纸质或近纸质, 长圆形、宽披针形或长圆状卵形, 顶端渐尖, 基部微心形或浅心形, 长 8—12 厘米, 宽 2.8—4 厘米, 全缘, 基出脉 5, 最外两条近边缘, 幼时两面被星状毛, 以后几无毛, 叶面基出脉微凹, 侧脉不明显, 背面基出脉及侧脉隆起, 有时多少被星状毛, 细脉不明显; 叶柄长约 5 毫米, 密被星状毛, 具槽, 槽两侧有 1 排刚毛。由聚伞花序组成的圆锥花序, 顶生, 长约 22 厘米, 宽约 12 厘米, 多花, 密被星状毛, 花序中常夹有叶, 苞片早落, 小苞片小, 三角形, 长不到 1 毫米, 与花梗、花萼密被星状毛, 花梗长 2—5 毫米; 花萼管状钟形, 长 5—7 毫米, 檐部膜质, 裂片不明显; 花瓣白色, 广卵形, 顶端急尖, 长约 7 毫米, 宽 6 毫米; 雄蕊长者长约 12 毫米, 花药长约 8 毫米, 成熟时呈 U 字形弯曲, 基部前方具 2 小瘤, 后方具三角形片状短距, 短者不育, 长约 2.5 毫米, 花药片状, 卵形, 长约 1 毫米, 边缘具啮蚀状细齿, 基部具 2 线形片状体, 长约 1 毫米, 背部具尾状长距, 距长约 2 毫米; 子房卵形, 顶端平截, 具隔片。浆果近球形, 顶端平截, 为宿存萼所包。花期 6 月或 11 月, 果期 6—7 月。

产广东(仅海南岛)。生于海拔约 400 米的密林中, 常攀援于乔木上。印度、越南至马来西亚均有。

21. 酸脚杆属——*Medinilla* Gaud.

Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 484. t. 106. 1826; DC. Prodr. 3: 167. 1828; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 759. 1867; Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 572. 1891; 侯宽昭, 中国种子植物科属辞典 260. 1958; 海南植物志 2: 37. 1965; Maxwell in Gard. Bull. Sing.



1—2.翅茎蜂斗草 *S. alata* Chun et How ex C.Chen var. *alata*: 1.花枝, 2.花纵剖(去花瓣)。
 3—4.败蕊无距花 *Stapfiophyton degeneratum* C. Chen: 3.植株上部, 4.花纵剖(去花瓣)。
 5—6.蕺牡丹 *Diplectria barbata* (Wall. ex C. B. Clarke) Franden et Roos: 5.果枝, 6.花纵剖(去花瓣)。(吴锡麟绘)