

米,直径5—6毫米,无毛,顶端具环状宿存萼檐。花期8—10月,果期3—5月。

产云南。生于海拔600—1000米的山坡、山谷密林中荫湿的地方或路旁、沟边。模式标本采自云南西双版纳小勐养。

本种与谷木 *M. ligustrifolium* Champ. var. *ligustrifolium* 十分相似,但本种花序总梗极短,通常着生于落叶的叶腋,伞形花序,苞片披针形;果小,直径5—6毫米,可以区别。

7. 禄春谷木 图版 57: 5

Memecylon luchuenense C. Chen, 植物研究, 4(3): 67. 1984.

灌木,高约30厘米;小枝棕褐色,四棱形,棱上有狭翅,以后呈圆柱形,无毛,分枝多。叶片革质,狭椭圆形或线状椭圆形,顶端钝渐尖,基部楔形,下延,长3.5—5.5厘米,宽6—13毫米,全缘,两面无毛,叶面中脉下凹,背面隆起,侧脉两面均不明显;叶柄长1—3毫米,略具翅。聚伞花序,腋生,长约1厘米,有果2—3个,每叶腋中有1—2个果序,总梗长2—4毫米,四棱形,无毛。花未详。果球形,无毛,直径约7毫米,顶端冠以宿存萼檐,萼檐具4齿,齿广三角形,长约0.5毫米;果梗长约2毫米,圆柱形。果期约10月。

产云南。生于海拔约480米的河滩,石堆灌木丛中,成片生长。模式标本采自云南绿春。

本种与我国产的其他种的区别是,叶片狭小,狭椭圆形或线状椭圆形,长3.5—5.5厘米,宽6—13毫米;每叶腋中具1—2个聚伞花序。

8. 棱果谷木(海南植物志)

Memecylon octocostatum Merr. et Chun in *Sunyatsenia* 2: 294. pl. 66. 1935; H. L. Li in *Journ. Arn. Arb.* 25: 41. 1944; 海南植物志 2: 39. 1965.

灌木,高1—3米,分枝多,树皮灰褐色;小枝四棱形,棱上略具狭翅,以后渐钝。叶片坚纸质或近革质,椭圆形或广椭圆形,顶端广钝急尖,具小尖头,基部广楔形,长1.5—3.5厘米,宽7—18毫米,全缘,两面无毛,干时叶面黑褐绿色,略具光泽,中脉下凹,背面浅褐色,中脉隆起,侧脉两面微隆起;叶柄长1—2毫米。聚伞花序,腋生,极短,长6—8毫米,花少,无毛;总梗长2—4毫米,苞片钻形,长约1毫米;花梗长1—2毫米,无毛;花萼钟状杯形,四棱形,长2—2.8毫米,无毛,裂片三角形或卵状三角形,长约0.8毫米;花瓣淡紫色,卵形,顶端渐尖,近基部具不规则的小齿,长约3毫米,宽约1.5毫米;雄蕊2.5—3毫米,药室与膨大的圆锥形药隔长约1.2毫米,脊上具1环状体;花丝长约2.5毫米。果扁球形,直径约7毫米,有8条隆起且极明显的纵肋,肋粗达1毫米,顶端冠以明显的宿存萼檐。花期5—6月或11月,果期11月至翌年1月。

产广东南部,见于山谷、山坡疏、密林中荫处。模式标本采自广东海南岛崖县。

本种与少花谷木 *M. pauciflorum* Blume 极近似,但本种花萼上的棱比较明显,萼齿宽短,果扁球形,有明显隆起的纵肋,可以区别。