

产广西、广东。生于海拔约 3000 米的山坡、平地或缓坡的疏、密林中或灌木丛中阳处及水边。缅甸、越南至马来西亚也有。

11. 黑叶谷木(海南植物志) 图版 57: 1—3

Memecylon nigrescens Hook. et Arn. in Bot. Beechey Voy. 186. Triana in Trans. Linn. Soc. 28: 159. 1871; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 302. 1887; Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 1165. 1891; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 185. 1924; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 13: 65. 1934; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 41. 1944 et l. c. 26: 121. 1945; 海南植物志 2: 41. 1965.

灌木或小乔木,高 2—8 米;小枝圆柱形,无毛,分枝多,树皮灰褐色。叶片坚纸质,椭圆形或稀卵状长圆形,顶端钝急尖,具微小尖头或有时微凹,基部楔形,长 3—6.5 厘米,宽 1.5—3 厘米,干时黄绿色带黑色,全缘,两面无毛,光亮,叶面中脉下凹,侧脉微隆起;叶柄长 2—3 毫米。聚伞花序极短,近头状,有 2—3 回分枝,长 1 厘米以下,总梗极短,多花;苞片极小,花梗长约 0.5 毫米,无毛;花萼浅杯形,顶端平截,长约 1.5 毫米,直径约 2 毫米,无毛,具 4 浅波状齿;花瓣蓝色或白色,广披针形,顶端渐尖,边缘具不规则裂齿 1—2 个,长约 2 毫米,宽约 1 毫米,基部具短爪;雄蕊长约 2 毫米,药室与膨大的圆锥形药隔长约 0.8 毫米,脊上无环状体;花丝长约 1.5 毫米。浆果状核果球形,直径 6—7 毫米,干后黑色,顶端具环状宿存萼檐。花期 5—6 月,果期 12 月至翌年 2 月。

产广东。生于海拔 450—1700 米的山坡疏、密林中或灌木丛中。越南也有。模式标本采自广东沿海。

补遗: 本种置于过路惊 *Bredia quadrangularis* Cogn. 及鸭脚茶 *B. sinensis* (Diels) H. L. Li 之间。

2a. 双腺野海棠(植物研究)

Bredia biglandularis C. Chen, 植物研究, 4(3): 39. 1984.

小灌木,高约 60 厘米;茎木质,分枝,幼时扁,以后圆柱形,无毛,节上膨大,具明显的叶痕。叶片坚纸质,卵形至近圆形,顶端具钝短渐尖或急尖,基部圆形,长 3—4.5 厘米,宽 1.6—2.6 厘米,或长 3.3—3.8 厘米,宽 2.7—3.2 厘米,边缘近全缘或具疏、不明显的细锯齿,5 基出脉,最外侧的两条近边缘且不明显,两面被微柔毛,叶面基出脉下凹,基部具 2 腺点,背面脉隆起,明显;叶柄具槽,长 5—10 毫米,无毛。聚伞花序组成圆锥花序,具 2—3 分枝,无毛;花未详。蒴果杯状,为宿存萼所包,宿存萼与果同形等大,直径约 4 毫米,无毛,带紫色,四棱形,萼齿极短渐尖,长约 0.5 毫米。花期未详,果期约 10 月。

产广西西南部。生于山脚、阴处和水旁岩石上。模式标本采于广西东兴。

本种与秀丽野海棠 *B. amoena* Diels var. *amoena* 相似,但后者小枝被柔毛及腺毛;叶缘具粗细锯齿,叶面基出脉基部无腺点,与本种极易区别。



1—3. 黑叶谷木 *Memecylon nigrescens* Hook. et Arn.; 1. 花枝, 2. 花纵剖 3. 花瓣。4. 单果谷木 *M. ligustrifolium* Champ. var. *monocarpum* C. Chen: 果枝。5. 裸唇谷木 *M. luchuenense* C. Chen: 果枝。(李锡畴绘)