

部和西藏南部。生于海拔(2300—)3000—4200(—4700)米山沟谷湿地或开旷山坡较湿沙地或多石砾土。也分布于尼泊尔、锡金、不丹、印度至缅甸北部。

本种与喜马拉雅柳兰及柳兰 *E. angustifolium* 近缘,在这些种重叠的分布区常可见到它们间的过渡类型,但本种叶网脉明显、长的果梗等特征易于区别。

4. 柳兰 (东北植物检索表) 铁筷子 (四川), 火烧兰 (云南泸水), 糯芋 (云南丽江) 图版 17: 3—7

*Epilobium angustifolium* L. Sp. Pl. 1: 347. 1753; Maxim. Prim. Fl. Amur. 104. 1859; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. India 2: 582. 1879; Hance, J. Bot. 21: 321. 1883; Hausskn. Monogr. Epil. 37. 1884; Forb. & Hemsl. in J. Linn. Soc. Bot. 23: 307. 1887; Diels in Bot. Jahrb. Syst. 29: 484. 1900; Nakai in Bot. Mag. (Tokyo) 22: 75. 1908; et Fl. Kor. 1: 241. 1909; Hara in Ohwi, Fl. Japan 820. 1953, (Engl. ed.) 657. 1965, p. p., Raven in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Bot. 2: 346. 1962; et in Notes Royal Bot. Gard. Edinburgh 24: 186. 1962; et in K. H. Rechinger, Fl. Iran. 7: 5. 1964; et in Tutin et al., Fl. Europ. 2: 309. 1968; Mosquin, Brittonia 18: 167. 1966; Chamberlain & Raven in Davis, Fl. Turkey 4: 185. 1972; R. Stewart, Ann. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir 505. 1972; Hara in Hara & Williams, Enum. Fl. Pl. Nepal 2: 174. 1979; Hoch in Nasir & Ali, Fl. Pakistan 139: 11. 1981; C. J. Chen, Hoch & Raven in Acta Phytotax. Sin. 26: 88. 1988; et Syst. Bot. Monogr. 34: 44. f. 14. 1992; 河北植物志 2: 220, 图 1123. 1988; 内蒙古植物志, ed. 2, 3: 570, 图版 223 (1—3). 1989. ——*Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop. Fl. Carniol., ed. 2, 1: 271. 1772; Kornar, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 25: 88. 1905; et Fl. Penin. Kamtsch. 2: 317. 1929; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 602. 1933; Steinb. in Stishkin & Bobrov, Fl. URSS 15: 622. 1949; 东北植物检索表 235. 1959; 北京植物志 2: 668. 1964; 同书, 修订版 1: 626. 1984, p. p.; 中国高等植物图鉴 2: 1021, 图 3771. 1972, p. p.; 东北草本植物志 6: 155, 图版 61 (1—3). 1977, p. p.; 内蒙古植物志 4: 129. 1979, p. p.; 秦岭植物志 1 (3): 355, 图 313. 1981, p. p.; Grubov, Key Vasc. Pl. Mongol. 185. 1982; 云南植物志 4: 177, 图版 53 (1—7). 1986, p. p.; 西藏植物志 3: 364. 1986, p. p.; 辽宁植物志, 上册 1246, 图版 534 (1—3). 1988, p. p. ——*Epilobium spicatum* Lam. Fl. Franc. 3: 482. 1778; Boiss., Fl. Orient. 2: 745. 1872; H. Lév. Icon. Gen. Epil. t. 226. 1911. ——*E. nerlifolium* H. Lév. Monde Pl. 6: 125. 1896, nom. superfl.; et in Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. 9: 210. 1900. ——*Chamaenerion angustifolium* (L.) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 7: 86. 1972.