

鸭的饲料。

4. 四蕊狐尾藻 (新拟) 四蕊菜 (海南植物志) 图版 28: 5—7

Myriophyllum tetrandrum Roxb. in Carey, Fl. Ind. 1: 470 1820; Miq. Fl. Ind. Bat. 1: 634. 1855; Engler, Pflanzenr. 23 (IV .225): 96. 1905. — *M. indicum* Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 433. 1878; 海南植物志 1: 433. 1964.

多年生沉水草本植物, 根状茎发达, 在底泥中蔓延, 节部生根。茎圆柱形, 顶部伸出水面, 少分枝, 长达 2 米。叶通常 5 片轮生, 篳状分裂, 常长达 9 厘米, 裂片羽毛状, 长达 13 毫米, 茎顶部水上叶披针形或匙形, 有齿刻或不明显的锯齿, 渐次变成苞片状、掌状浅裂, 长 0.4 毫米。花单生于叶腋, 具短梗, 5 朵轮生; 花小、单性, 雌雄同株, 上部为雄花, 下部为雌花; 萼管四棱形、具 4 槽裂片三角形, 长 0.2 毫米, 宽 0.15 毫米; 花瓣匙形, 扁平, 膜质, 长约 1 毫米, 宽约 0.4 毫米; 雄蕊 4 枚; 花柱 4, 向外伸出而下弯, 柱头有乳头状突起。果直径 2 毫米, 成熟时褐色。花期 3—9 月, 果期 4—10 月。

产海南三亚市、乐东市。生于浅水中。印度、越南也有分布。

5. 矮狐尾藻 (新拟) 矮菜 (广州植物志) 图版 28: 1—4

Myriophyllum humile Morong in Bull. Torrey Bot. Club. 18: 242. 1894; M. H. Lecomte Fl. Gen. Indochine 2: 718. 1908; 广州植物志 167, 图 72. 1956. — *Purshia humilis* Raf. in Med. Repos. N. York 5: 357. 1808. — *M. ambigum* Nutt. Gen. North. Amer. Pl. 2: 212. 1818.


多年生水生草本。根状茎在水底泥中蔓延, 节部生根。茎多数, 顶部伸出水面。叶互生, 有时假轮生, 沉水叶羽状细裂、长 3—3.5 厘米, 茎上部水上叶羽状裂, 或尖锯齿状, 或全缘 (生最顶部的)。花单生于叶腋内, 通常两性, 无花柄; 苞片 2 枚, 卵形, 全缘; 萼管四方形, 长 0.5 毫米, 裂片卵形, 先端短尖; 花瓣 4, 阔匙形, 长 1.2 毫米; 雄蕊 4, 花药狭长圆形。分果四方角柱状, 平滑, 长不及 1 毫米。花果期夏秋季。

产广东、福建。喜生于水田中。北美及印度东部也有分布。

2. 小二仙草属 *Haloragis* J. R. & G. Forst.

J. R. & G. Forst., Charact. Gen. Pl. 61, t. 31. 1776.

陆生平卧或直立的纤细草本, 稀亚灌木; 多数种类的茎沿叶柄下延成棱, 分枝或不分枝。叶小, 下部和幼枝上的叶常对生, 上部的有时互生, 革质或薄革质, 全缘或具锯齿, 具叶柄或近无叶柄。花小, 单生或簇生于上部叶腋, 成假二歧聚伞花序, 有时生于



图版 28 1—4. 矮狐尾藻 *Myriophyllum humile* Morong: 1. 植株上部及花序, 2. 花蕾, 3. 花开放状, 4. 果实。

5—7. 四蕊狐尾藻 *M. tetrandrum* Roxb.: 5. 植株上部及花序, 6. 雄花, 去花被片示雄蕊, 7. 果实。(李爱莉部

分仿《广州植物志》)