

产湖北、湖南、江西、福建、台湾、四川、贵州、广东、广西及云南等省区。生于潮湿的荒山草丛中。澳大利亚东南部哈瓦利 (Hawalli)、密克罗尼西亚、马来西亚、越南、泰国、印度等也有分布。

2. 小二仙草 (植物名实图考) 船板草 (广西植物名录), 豆瓣草 (广西植物名录), 扁宿草、下风草 (四川野生经济植物志), 沙生草 (中国高等植物图鉴) 图版 29: 1—5

*Haloragis micrantha* (Thunb.) R. Br. ex Sieb. et Zucc. in Flind. Vov. App. 550. 1814; Hayata, Icon. Pl. Form. 2: 15. 1912; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7 (2): 606. 1933; Tardieu-Blur. Fl. Laos, Camb. & Vietn. 4: 266. 1965; 广州植物志 166. 1956; 海南植物志 1: 431. 1964; Fl. Malesiana I (7): 244. 1971; 中国高等植物图鉴 2: 1021, 图 3772. 1972; T. C. Huang in H. L. Li, Fl. Taiwan 3: 800, pl. 858. 1977; C. F. Hsieh in T. C. Huang ibid. ed. 2. 3: 971, pl. 484. 1993; 江苏植物志, 下册 553, 图 1639. 1982; 云南植物志 4: 193. 1986; 安徽植物志 3: 559, 图 1597. 1988; 贵州植物志 4: 289, 图版 104 (1—3). 1989; 福建植物志 4: 143, 图 121. 1989; 浙江植物志 4: 317, 图 4-401. 1993. — *Gonocarpus micranthus* Thunb. Nov. Gen. 55. 1783; et Fl. Jap. 15—69. 1784.

多年生陆生草本, 高 5—45 厘米; 茎直立或下部平卧, 具纵槽, 多分枝, 多少粗糙, 带赤褐色。叶对生, 卵形或卵圆形, 长 6—17 毫米, 宽 4—8 毫米, 基部圆形, 先端短尖或钝, 边缘具稀疏锯齿, 通常两面无毛, 淡绿色, 背面带紫褐色, 具短柄; 茎上部的叶有时互生, 逐渐缩小而变为苞片。花序为顶生的圆锥花序, 由纤细的总状花序组成; 花两性, 极小, 直径约 1 毫米, 基部具 1 苞片与 2 小苞片; 萼筒长 0.8 毫米, 4 深裂, 宿存, 绿色, 裂片较短, 三角形, 长 0.5 毫米; 花瓣 4, 淡红色, 比萼片长 2 倍; 雄蕊 8, 花丝短, 长 0.2 毫米, 花药线状椭圆形, 长 0.3—0.7 毫米; 子房下位, 2—4 室。坚果近球形, 小形, 长 0.9—1 毫米, 宽 0.7—0.9 毫米, 有 8 纵钝棱, 无毛。花期 4—8 月, 果期 5—10 月。

产河北、河南、山东、江苏、浙江、安徽、江西、福建、台湾、湖北、湖南、四川、贵州、广东、广西、云南等省区。生于荒山草丛中。澳大利亚、新西兰、马来西亚、印度、越南、泰国、日本、朝鲜等国亦有分布。

全草入药, 能清热解毒, 利尿除湿, 散瘀消肿, 治毒蛇咬伤。全草为羊的好饲料。



图版 29 1—5. 小二仙草 *Haloragis micrantha* (Thunb.) R. Br. ex Sieb. et Zucc. : 1. 植株, 2. 花, 3. 去花被与雄蕊示雌蕊, 4. 叶, 5. 茎一段。6. 黄花小二仙草 *H. chinensis* (Lour.) Merr. : 花枝。(李爱莉仿《中国高等植物图鉴》及《海南植物志》)