

分 种 检 索 表

1. 一年生草本 3. 假繁縷 *T. macranthum* Franchet
 1. 多年生草本。
 2. 雄蕊 20—25 枚或 16—20 枚 2. 日本假繁縷 *T. japonicum* Okubo et Makino
 2. 雄蕊 5—7 枚 1. 台湾假繁縷 *T. formosanum* (Ohwi) Ohwi & Liu

1. 台湾假繁縷 (新拟) 台湾纤花草 (台湾植物志)

Theligonum formosanum (Ohwi) Ohwi & Liu in H. L. Li, Fl. Taiwan 3: 904, pl. 860. 1977; T. C. Huang, l. c. ed. 2, 3: 975, pl. 486. 1993. —*Cynocrambe formosana* Ohwi in Acta Phytotax. Geobot. 2 (3): 157. 1933.

多年生肉质矮小草本，干时带黑色。茎直立，自基部匍匐茎长出分枝，高 10—15 厘米，稍被短柔毛。叶在上部互生，在下部对生，叶片宽卵圆形，长 1.2—2 厘米，宽 1—1.5 厘米，先端急尖，基部稍心形，下延到叶柄，上面被毛，下面脉上被稀疏毛；托叶三角状卵形，与叶柄基部合生抱茎，边缘有睫毛。花单性同株。雌花：腋生，无柄；花被 2 裂，裂片钝形；子房 1 室，内有胚珠 1 颗；花柱基生，下弯。雄花：花被 3 深裂，裂片披针形，长 0.5—0.6 厘米，几无毛，薄膜质，反卷，有 3—5 脉；雄蕊 5—7，花丝纤细，长 0.25—0.3 厘米；花药丁字形着生。坚果状的核果近球形，两侧压扁，有毛，稍偏斜，长 0.4 厘米，径 0.2 厘米，包藏于膜质的萼内，有短柄。

特产我国台湾 (屏东县大屋山，模式产地)。

2. 日本假繁縷 (新拟)

Theligonum japonicum Okubo & Makino in Bot. Mag. Tokyo 8 (90): 348, 1894; 牧野富太郎：新日本植物图鉴 136. 1979; 浙江植物志 4: 320, 图 4—405. 1993.

直立或斜生的多年生肉质草本植物，茎多从基部分枝，高 15—36 厘米，茎部有白色或锈色短毛，下部老茎常无毛。须根多数。茎叶常有臭气味。上部叶互生，下部叶对生，稍带肉质、卵形或近椭圆形，长 0.7—3 厘米，宽 0.7—1.5 厘米，两面均有白色或锈色短毛，尤在叶的边缘比较明显，羽状脉，每边侧脉 3 条，弧形，叶柄长短不一；托叶膜质，卵形或卵状三角形，与叶柄基部合生抱茎。花雌雄同株，腋生，或在上部与叶成对对生，无花梗。雄花生于上部，每 2 朵与叶对生，花萼绿色，萼筒长 2 毫米，裂片 3，近条形，开放后反卷，花被 2—5，全裂，雄蕊 20—25，或 16—20，下垂、花丝纤细，花药丁字形着生，2 室，纵裂，雄蕊外露；雌花极小，腋生，闭合；3—4 齿裂，子房上位，被毛，花柱生于一侧。果为坚果状的核果，卵圆形，两侧压扁。春夏季开花。