

5. 掌状复叶 8. 鹅掌柴属 *Schefflera* J. R. & G. Forst.
 2. 子房 1 室; 胚马蹄状 18. 马蹄参属 *Diplopanax* Hand.-Mazz.

1. 多蕊木属*——*Tupidanthus* Hook. f. & Thoms.

Hook. f. & Thoms. in Bot. Mag. 82: t. 4908. 1856.

木质藤本。叶为掌状复叶,托叶和叶柄基部合生。花两性,数朵聚生成稀疏的伞形花序,几个伞形花序再组成顶生复伞形花序或短圆锥花序;总花梗粗壮;花梗无关节,粗壮;萼筒近全缘或有不明显的小齿;花瓣在花芽中镊合状排列,合生成帽状体,早落;雄蕊多数,排列成二至多轮;子房多室,无定数;无花柱,柱头多数,互相紧靠排列成分枝的长条状或放射状。果实核果状,革质,扁球形。种子多数;胚乳匀一。

本属的模式种: 多蕊木 *Tupidanthus calyptratus* Hook. f. & Thoms.

本属仅 1 种,分布于亚洲热带地区,自印度经我国西南部至越南、老挝、柬埔寨。

本属花有多数雄蕊、多室子房及无花柱等特征,被认为是本科现存最原始的属。但因其系藤本,叶为掌状复叶,故非现存其他各属的直接起源。

1. 多蕊木(种子植物名称) 脱辟木(中国树木分类学), 大七叶莲、龙爪叶(云南土名) 图版 1: 1—4

Tupidanthus calyptratus Hook. f. & Thoms. in Bot. Mag. 82: t. 4908. 1856; Seem. in Journ. Bot. 2: 240 (Revis. Heder. 6. 1863) 1864; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 740. 1879; Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(8): 28. f. 4 d—f. 1894; Vig. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 1170. pl. 139. 1—3. 1923; 钟心焯, 科学社丛刊 1: 185. 1924; 陈嵘, 中国树木分类学 934. 1937; Li in Sargentia 2: 12. 1942; 中国高等植物图鉴 2: 1025. f. 3780. 1972.

大藤本,初为直立灌木或小乔木,后分枝攀援而成大藤本;茎长 15—30 米,基部直径约 15 厘米,树皮黄棕色。叶有小叶 7—9;叶柄长 15—60 厘米,无毛;托叶和叶柄基部合生,短鞘状;小叶片革质,倒卵状长圆形至长圆形,长 12—26 厘米,宽 4—9 厘米,先端短渐尖,基部阔楔形至近圆形,两面均无毛,边缘全缘,侧脉 20—30 对,在边缘连合,明显;小叶柄长 3—5 厘米,无毛。伞形花序直径 4—6 厘米,有花 3—7 朵,3—5 个组成顶生复伞形花序或短圆锥花序;总花梗粗壮,长 4—8 厘米,无毛;苞片卵形,革质,长约 1.5 厘米;花梗粗壮,长 1.5—2 厘米,无毛;花大,直径 1.5—2.5 厘米;萼筒革

* 属的异名: 脱辟木属(中国树木分类学、中国植物科属检索表)。