

花序顶生,长达 35 厘米,主轴及分枝有绒毛或几无毛;伞形花序直径约 3 厘米,有花多数;总花梗粗壮,长 3—5 厘米;苞片卵形,长约 1 厘米;花梗长约 1 厘米,密生锈色绒毛;萼长 4 毫米,有绒毛,边缘有 5 齿;花瓣 5,三角状卵形,长 3.5 毫米,外面有绒毛;雄蕊 5;子房 2 室或 3 室,花盘隆起;花柱合生成柱状,长约 2 毫米。

产云南。模式标本采自云南腾冲。

5. 假柄掌叶树 图版 3:5—7

Euaraliopsis palmipes (Forrest ex W. W. Smith) Hutch. Gen. Fl. Pl. 2: 624. 1967—*Brassaiopsis palmipes* Forrest ex W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb. 10: 12. 1917; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 694. 1933; Li in Sargentia 2: 54. 1942.

有刺灌木,高 3—9 米。叶片纸质,直径 25—40 厘米,掌状 8—11 深裂;裂片长圆形或阔椭圆形,长 20—30 厘米,宽 6—10 厘米,先端圆形至尖形,基部圆形至截形,上面无毛或稍有短柔毛,下面密生短柔毛或几无毛,边缘有刺状锯齿,侧脉两面均明显,网脉不甚明显,放射状主脉裸出成假小叶柄,类似掌状复叶,有阔翅将其连成整片;叶柄长 12—25 厘米,疏生细刺,初有锈色短毛,不久毛脱落;托叶和叶柄基部合生,先端离生部分披针形。圆锥花序顶生,主轴粗壮,有短柔毛或几无毛;伞形花序直径 3—5 厘米,有花多数;总花梗长 2 厘米,结实后延长;花梗长约 1 厘米,有锈色短柔毛;萼长约 3 毫米,边缘有 5 尖齿;花瓣 5,长约 4 毫米,外面有短柔毛;子房 2 室,稀 3 室,花柱合生成柱状。果实卵球形,黑色,长 8 毫米,直径 5 毫米,宿存花柱长 2 毫米。 果期 10 月。

产云南(泸水、瑞丽、金平)。生于湿热带森林中,海拔约 1000 米。模式标本采自云南瑞丽。

本种叶片掌状 8—11 深裂,裂片有假小叶柄,有阔翅相连,叶柄疏生细刺,花序主轴无刺等特点,颇易识别。

6. 榕叶掌叶树

Euaraliopsis ficifolia (Dunn) Hutch. Gen. Fl. Pl. 2: 624. 1967—*Brassaiopsis ficifolia* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 35: 500. 1903; 钟心煊,科学社丛刊 1: 187. 1924; Li in Sargentia 2: 54. 1942.

灌木或小乔木,高 1—10 米;枝有刺。叶片纸质或膜质,直径 20—40 厘米,掌状 3—5 深裂,稀 6—7 裂;裂片长 15—26 厘米,宽 6—10 厘米,卵形,先端渐尖,基部狭,上面无毛,下面有稀疏星状毛或无毛,边缘有锯齿,侧脉和网脉两面均明显;叶柄无

