

花序顶生,长达 35 厘米,主轴及分枝有绒毛或几无毛;伞形花序直径约 3 厘米,有花多数;总花梗粗壮,长 3—5 厘米;苞片卵形,长约 1 厘米;花梗长约 1 厘米,密生锈色绒毛;萼长 4 毫米,有绒毛,边缘有 5 齿;花瓣 5,三角状卵形,长 3.5 毫米,外面有绒毛;雄蕊 5;子房 2 室或 3 室,花盘隆起;花柱合生成柱状,长约 2 毫米。

产云南。模式标本采自云南腾冲。

5. 假柄掌叶树 图版 3:5—7

Euaraliopsis palmipes (Forrest ex W. W. Smith) Hutch. Gen. Fl. Pl. 2: 624. 1967—*Brassaiopsis palmipes* Forrest ex W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb. 10: 12. 1917; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 694. 1933; Li in Sargentia 2: 54. 1942.

有刺灌木,高 3—9 米。叶片纸质,直径 25—40 厘米,掌状 8—11 深裂;裂片长圆形或阔椭圆形,长 20—30 厘米,宽 6—10 厘米,先端圆形至尖形,基部圆形至截形,上面无毛或稍有短柔毛,下面密生短柔毛或几无毛,边缘有刺状锯齿,侧脉两面均明显,网脉不甚明显,放射状主脉裸出成假小叶柄,类似掌状复叶,有阔翅将其连成整片;叶柄长 12—25 厘米,疏生细刺,初有锈色短毛,不久毛脱落;托叶和叶柄基部合生,先端离生部分披针形。圆锥花序顶生,主轴粗壮,有短柔毛或几无毛;伞形花序直径 3—5 厘米,有花多数;总花梗长 2 厘米,结实后延长;花梗长约 1 厘米,有锈色短柔毛;萼长约 3 毫米,边缘有 5 尖齿;花瓣 5,长约 4 毫米,外面有短柔毛;子房 2 室,稀 3 室,花柱合生成柱状。果实卵球形,黑色,长 8 毫米,直径 5 毫米,宿存花柱长 2 毫米。果期 10 月。

产云南(泸水、瑞丽、金平)。生于湿热带森林中,海拔约 1000 米。模式标本采自云南瑞丽。

本种叶片掌状 8—11 深裂,裂片有假小叶柄,有阔翅相连,叶柄疏生细刺,花序主轴无刺等特点,颇易识别。

6. 榕叶掌叶树

Euaraliopsis ficifolia (Dunn) Hutch. Gen. Fl. Pl. 2: 624. 1967—*Brassaiopsis ficifolia* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 35: 500. 1903; 钟心煊,科学社丛刊 1: 187. 1924; Li in Sargentia 2: 54. 1942.

灌木或小乔木,高 1—10 米;枝有刺。叶片纸质或膜质,直径 20—40 厘米,掌状 3—5 深裂,稀 6—7 裂;裂片长 15—26 厘米,宽 6—10 厘米,卵形,先端渐尖,基部狭,上面无毛,下面有稀疏星状毛或无毛,边缘有锯齿,侧脉和网脉两面均明显;叶柄无

刺,或上部有小刺,长15—46厘米;托叶和叶柄基部合生,先端离生部分三角形。圆锥花序顶生,主轴及分枝有锈色绒毛;伞形花序直径2.5—3厘米,有花多数;总花梗有锈色绒毛,长2—4厘米;花梗长1.2厘米;花白色,芳香;萼长2毫米,有绒毛,边缘近全缘;花瓣5,长3毫米,无毛;雄蕊5,花丝长3毫米;子房2室,花盘隆起,花柱合生成柱状,柱头离生。果实阔球形,略扁,黑色,直径8毫米,宿存花柱长约2毫米。花期8—10月,果期10—12月。

分布于云南(西双版纳、普洱、西畴、贡山)、广西(百色)。生于森林中,海拔650—2500米。模式标本采自云南思茅。

本种叶片掌状3—7深裂,和假通草 *Euaraliopsis ciliata* (Dunn) Hutch. 近似,但花序轴无刺,容易区别。

7. 盘叶掌叶树

Euaraliopsis fatsioides (Harms) Hutch. Gen. Fl. Pl. 2: 624. 1967——*Brassaiopsis fatsioides* Harms in Sargent, Pl. Wils. 2: 556. 1916; 钟心煊, 科学社丛刊 1: 187. 1924; Li in Sargentia 2: 55. 1942——*Brassaiopsis trevesioides* W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb. 10: 13. 1917.

灌木或乔木,高1—10米,胸径达20厘米以上。叶片膜质至纸质,直径30厘米或更大,掌状7—10深裂;裂片倒披针形至长圆状倒披针形,有时卵状长圆形,长16—25厘米,宽3—10厘米,先端短渐尖,基部略狭,上面有稀疏刚毛或几无毛,下面略有锈色绒毛或无毛,边缘有细锯齿,侧脉两面均明显,网脉上面不明显,下面明显;叶柄长30—60厘米,无毛或上部略有毛。圆锥花序顶生,长30厘米,主轴略有毛;伞形花序直径3.5—4厘米,有花多数;总花梗长2—3厘米,结实后可长至12厘米;花梗长0.8—2厘米,无毛或略有毛;花白色;萼无毛或几无毛,长2.5毫米,边缘有5个不明显的齿;花瓣5,长卵形,先端尖,长3—4毫米,无毛;子房2室;花盘厚,半球形,花柱合生成柱状。果实球形,蓝黑色,直径5—6毫米,宿存花柱长2毫米。花期7月,果期次年2月。

分布于云南(西双版纳、金平、沧源、贡山)、四川(雷波、马边、峨眉山)、贵州(毕节、安顺)。生于森林中,海拔500—2700米。模式标本采自四川。

图版3: 1—4. 浅裂掌叶树 *Euaraliopsis hainla* (Ham.) Hutch., 1.枝叶; 2.圆锥果序的一部分; 3.花蕾; 4.果实。5—7. 假柄掌叶树 *Euaraliopsis palmipes* (Forrest ex W. W. Smith) Hutch., 5.叶; 6.圆锥果序的一部分; 7.果实。8—12. 锈毛掌叶树 *Euaraliopsis ferruginea* (Li) Hoo & Tseng, 8.果枝; 9.掌状深裂叶; 10.花蕾; 11.花(除去花冠); 12.子房横切面。