

本种叶形和假通草 *Euaraliopsis ciliata* (Dunn) Hutch. 相近, 区别在于后者花序轴有刺, 萼明显有毛。

8. 锈毛掌叶树 锈毛柏那参(植物分类学报增刊), 锈毛罗伞(中国高等植物图鉴), 黄毛掌叶树(广西植物名录)图版 3: 8—12

***Euaraliopsis ferruginea* (Li) Hoo & Tseng, transl. nov. —*Dendropanax ferrugineus* Li in Sargentia 2: 47. f. 8. 1942—*Gilibertia angustiloba* Hu, Icon. Pl. Sin. 5: 36. f. 236. 1937, non Hu (1930)—*Brassaiopsis ferruginea* (Li) Hoo, 植物分类学报增刊 1: 149. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 1032. f. 3794. 1972.**

无刺灌木, 高 1—2 米; 小枝灰色, 初有锈色星状绒毛, 后无毛。叶片纸质或薄革质, 二型, 不分裂或掌状 2—3 深裂; 不分裂叶片披针形、卵状披针形或长圆状披针形, 长 7—20 厘米, 宽 1.5—5 厘米, 先端尾状渐尖, 基部钝形或近圆形, 分裂叶片的裂片狭披针形, 上面绿色, 下面淡绿色, 幼时两面均密生锈色星状毛, 后上面无毛, 下面星状毛变稀, 边缘有锐锯齿, 主脉 3 条, 侧脉 8—16 对, 不明显或不甚明显, 网脉不明显; 叶柄纤细, 长 4.5—10 厘米。圆锥花序顶生, 主轴长 1—7 厘米, 幼时密生锈色星状绒毛, 后几无毛; 伞形花序 2—5 个, 直径约 3 厘米, 有花 20—30 朵; 总花梗长 2—7 厘米; 苞片卵形至披针形, 长 5—8 毫米, 先端 3 裂, 略有毛; 小苞片宿存, 长 1—2 毫米; 萼长 2.5 毫米, 疏生锈色星状毛, 边缘有 5 个三角形小齿; 花瓣 5, 绿色, 三角状卵形, 长 2.5—3 毫米; 雄蕊 5, 花丝长 1.5—2 毫米; 子房 2 室, 稀 3 室; 花柱合生成柱状, 长 1.5 毫米。果实球形, 黑色, 直径 8 毫米。种子球形。 花期 6—7 月, 果期 7—8 月。

分布于贵州(大方)、云南(屏边、麻栗坡)、广西(金秀、龙胜、兴安)、广东(英德滑水山)。生于森林中, 海拔 1200—1600 米。模式标本采自广西金秀。

本种叶为单叶, 伞形花序 2—5 个稀疏地总状排列于长 1—7 厘米的主轴上, 子房 2 室(李惠林原记载误为 5 室), 花柱合生成柱状, 果实上的花盘远高于萼等点, 说明本种是掌叶树属 *Euaraliopsis* Hutch., 而非树参属 *Dendropanax* Decne. & Planch.。

待 查 的 种

瓜叶掌叶树

***Brassaiopsis papayoides* Hand.-Mazz. in Akad. Wiss. Wien Math.-Nat. Kl. 61: 120. 1925 & Symb. Sin. 7: 693. 1933; Li in Sargentia 2: 60. 1942.**

小乔木, 高 2.5 米, 几不分枝; 茎上有明显的叶痕和糠屑状的毛, 并疏生粗短刺。叶几轮生茎顶; 叶片革质, 圆形, 直径 23—54 厘米, 基部宽, 深心脏形, 掌状 7—9 裂;

