

本种叶形和假通草 *Euaraliopsis ciliata* (Dunn) Hutch. 相近, 区别在于后者花序轴有刺, 萼明显有毛。

8. 锈毛掌叶树 锈毛柏那参(植物分类学报增刊), 锈毛罗伞(中国高等植物图鉴), 黄毛掌叶树(广西植物名录)图版 3: 8—12

Euaraliopsis ferruginea (Li) Hoo & Tseng, transl. nov. —*Dendropanax ferrugineus* Li in *Sargentia* 2: 47. f. 8. 1942—*Gilibertia angustiloba* Hu, *Icon. Pl. Sin.* 5: 36. f. 236. 1937, non Hu (1930)—*Brassaiopsis ferruginea* (Li) Hoo, *植物分类学报增刊* 1: 149. 1965; *中国高等植物图鉴* 2: 1032. f. 3794. 1972.

无刺灌木, 高 1—2 米; 小枝灰色, 初有锈色星状绒毛, 后无毛。叶片纸质或薄革质, 二型, 不分裂或掌状 2—3 深裂; 不分裂叶片披针形、卵状披针形或长圆状披针形, 长 7—20 厘米, 宽 1.5—5 厘米, 先端尾状渐尖, 基部钝形或近圆形, 分裂叶片的裂片狭披针形, 上面绿色, 下面淡绿色, 幼时两面均密生锈色星状毛, 后上面无毛, 下面星状毛变稀, 边缘有锐锯齿, 主脉 3 条, 侧脉 8—16 对, 不明显或不甚明显, 网脉不明显; 叶柄纤细, 长 4.5—10 厘米。圆锥花序顶生, 主轴长 1—7 厘米, 幼时密生锈色星状绒毛, 后几无毛; 伞形花序 2—5 个, 直径约 3 厘米, 有花 20—30 朵; 总花梗长 2—7 厘米; 苞片卵形至披针形, 长 5—8 毫米, 先端 3 裂, 略有毛; 小苞片宿存, 长 1—2 毫米; 萼长 2.5 毫米, 疏生锈色星状毛, 边缘有 5 个三角形小齿; 花瓣 5, 绿色, 三角状卵形, 长 2.5—3 毫米; 雄蕊 5, 花丝长 1.5—2 毫米; 子房 2 室, 稀 3 室; 花柱合生成柱状, 长 1.5 毫米。果实球形, 黑色, 直径 8 毫米。种子球形。 花期 6—7 月, 果期 7—8 月。

分布于贵州(大方)、云南(屏边、麻栗坡)、广西(金秀、龙胜、兴安)、广东(英德滑水山)。生于森林中, 海拔 1200—1600 米。模式标本采自广西金秀。

本种叶为单叶, 伞形花序 2—5 个稀疏地总状排列于长 1—7 厘米的主轴上, 子房 2 室(李惠林原记载误为 5 室), 花柱合生成柱状, 果实上的花盘远高于萼等点, 说明本种是掌叶树属 *Euaraliopsis* Hutch., 而非树参属 *Dendropanax* Decne. & Planch.。

待 查 的 种

瓜叶掌叶树

Brassaiopsis papayoides Hand.-Mazz. in *Akad. Wiss. Wien Math.-Nat. Kl.* 61: 120. 1925 & *Symb. Sin.* 7: 693. 1933; Li in *Sargentia* 2: 60. 1942.

小乔木, 高 2.5 米, 几不分枝; 茎上有明显的叶痕和糠屑状的毛, 并疏生粗短刺。叶几轮生茎顶; 叶片革质, 圆形, 直径 23—54 厘米, 基部宽, 深心脏形, 掌状 7—9 裂;

裂片深达全叶片长的 $2/3$ 至 $3/4$ ，卵形至倒卵状椭圆形，先端尖或钝，初时下面脉上有棕色绒毛，后毛脱落，边缘又常有少数不规则向外广展的小裂片，疏生粗锯齿，侧脉在两面隆起而明显，网脉在下面明显，上面不明显；叶柄约为叶片长的 $2/3$ —1 倍，圆柱形，基部广展；托叶和叶柄基部合生，先端离生部分舌状，长至 1 厘米。圆锥花序主轴粗壮，分枝少，有糠屑状绒毛，长 6—16 厘米；苞片卵状舟形，革质，长达 2 厘米；伞形花序几无总花梗，约有花 100 朵；花梗粗短，长约 2 毫米，花序几成头状；小苞片线形，和花梗等长；萼长 1—1.5 毫米，边缘有 5 个阔卵形的齿；花冠厚，基部宽 1.5 毫米，有 10 稜；雄蕊 5，长约 0.7 毫米；子房倒圆锥形，长 1.5 毫米。果实未见。

产云南(蒙自)、贵州(镇宁)。生于森林中，海拔 400—1300 米。未见到标本，根据原记载描述。

本种叶为单叶，叶片掌状 7—9 分裂，亦应改隶掌叶树属 *Euaraliopsis* Hutch.，但本种基于幼小花序的标本，子房室没有记载，难以断定。李惠林从“花冠具 10 稜”，疑为刺通草 *Trevesia palmata* Vis.，因尚无确证，姑列此以待考正。

8. 鹅掌柴属*——*Schefflera* J. R. & G. Forst. nom. conserv.

J. R. & G. Forst. Char. Gen. 45. t. 23. 1775; Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(8): 35. 1894; 何景、曾沧江, 植物分类学报增刊 1: 130. 1965; Hutch. Gen. Fl. Pl. 2: 69. 1967——*Sciodaphyllum* P. Br. Hist. Jam. 190. pl. 19. f. 1, 2. 1756, nom. rejic.——*Heptapleurum* Gaertn. Fruct. & Sem. 2: 472. t. 178. 1791——*Agalma* Miq. Fl. Ind. Bat. 1: 752. 1855; Hutch. l.c. 2: 54. 1967.

直立无刺乔木或灌木，有时攀援状；小枝粗壮，被星状绒毛或无毛。叶为单叶(我国无分布)或掌状复叶；托叶和叶柄基部合生成鞘状。花聚生成总状花序、伞形花序或头状花序，稀为穗状花序，再组成圆锥花序；花梗无关节；萼筒全缘或有细齿；花瓣 5—11，在花芽中镊合状排列；雄蕊和花瓣同数；子房通常 5 室，稀 4 室或多至 11 室；花柱离生，或基部合生而顶端离生，或全部合生成柱状，或无花柱，柱头明显或不明显。果实球形，近球形或卵球形，通常有 5 稜，最多至 11 稜，有时稜不明显。种子通常扁平；胚乳匀一，有时稍呈嚼烂状。

* 属的异名：鸭母树属(种子植物名称、经济植物手册)。