

Agalma discolor (Merr.) Hutch. l.c. 2: 622. 1967, syn. nov.

乔木或灌木,高3—8米;小枝粗壮,幼时密生黄棕色星状绒毛,不久毛即脱净;髓白色,薄片状。叶有小叶4—7;叶柄长4—16厘米,最长可至70厘米,幼时密生星状绒毛,成长后除基部外无毛;小叶片纸质至薄革质,稀革质,形状变化很大,椭圆状长圆形、卵状长圆形、卵状披针形或长圆状披针形,稀线状长圆形,长6—20厘米,最长可达35厘米,宽2—8厘米或稍宽,先端急尖至短渐尖,基部钝形至圆形,有时截形,上面无毛,下面密生灰白色或黄棕色星状绒毛,老时变稀,边缘全缘或疏生不规则的牙齿,有时有不规则缺刻或羽状分裂,中脉下面隆起,侧脉8—12对,有时多至15对以上,上面平坦或微隆起,下面稍隆起,网脉上面稍下陷,稀平坦,下面为绒毛掩盖而不明显;小叶柄粗壮,不等长,中央的较长,两侧的较短,被毛和叶柄一样。花无梗,密集成穗状花序,再组成长40厘米以上的大圆锥花序;主轴和分枝幼时均密生星状绒毛,后毛渐脱稀;苞片及小苞片三角形,均密生星状绒毛;花白色;萼长1.5—2毫米,疏生星状短柔毛,有5齿;花瓣5,三角状卵形,无毛;雄蕊5,花丝长约3毫米;子房4—5室;花柱合生成柱状,长不及1毫米,柱头不明显;花盘隆起。果实球形,紫黑色,直径约4毫米,几无毛;宿存花柱长1.5—2毫米,柱头头状。花期10—11月,果期次年1月。

广布于云南、贵州、四川、湖北、湖南、广西、广东、江西以及福建。生于山谷溪边的常绿阔叶林中,阴湿的林缘或疏林也能生长,海拔600—3100米。模式标本采自云南洱源孟获营三场究。

本种为民间常用草药,根皮治跌打损伤,叶有发表功效。

本种小叶片形状变异虽大,但小叶片下面密生白色或黄棕色星状绒毛,花密集成圆锥状的穗状花序,容易识别。

Schefflera discolor Merr. 早已作为 *Schefflera delavayi* (Franch.) Harms var. *ochrascens* Hand.-Mazz. 的异名处理,而 *Schefflera delavayi* (Franch.) Harms var. *ochrascens* Hand.-Mazz. 又于1952年由何椿年合并入原变种。所以, *Agalma discolor* (Merr.) Hutch. 应作为本种异名处理。

2. 异叶鹅掌柴 鸭脚木(云南土名)

Schefflera diversifoliolata Li in Sargentia 2: 26. f. 3. 1942 — *Schefflera pingpienensis* Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1: 134. 1965, syn. nov. — *Agalma diversifoliolatum* (Li) Hutch. Gen. Fl. Pl. 2: 622. 1967, syn. nov.

灌木或小乔木,高2—8米。叶有小叶12—14,稀7—8;叶柄长达50厘米,无毛;小叶片纸质至薄革质,椭圆状长圆形,稀倒卵状长圆形,长9—18厘米,宽3.5—5.5厘米,先端渐尖,基部阔楔形至近圆形,稍下延,上面无毛,下面疏生星状细柔毛或无毛,边缘全缘,侧脉8—15对,上面略明显,下面隆起,网脉疏散,上面不明显,下面略明显;小叶柄不等长,中央的长约7厘米,两侧的长0.5—2厘米。圆锥花序顶生,长40厘米以上,主轴和分枝均疏生星状细柔毛至几无毛;花长约3毫米;苞片小,长约1毫米;花梗长1.5—3毫米,扁平,疏生星状短柔毛;萼钟形,长1.5毫米,疏生星状短柔毛,边缘有5个三角形小齿;花瓣5,三角状卵形,长约2毫米,无毛;雄蕊5,比花瓣短;子房5室;花柱合生成柱状,长约1毫米。果实球形,有5稜,黑色,直径约4毫米;宿存花柱长约1.5毫米,柱头盘状,5小裂;花盘扁平。花期9月,果期11—12月。

产云南东南部。生于疏林中湿地,海拔1650米。模式标本采自云南屏边。

本种的原始记载,叶只有7小叶,但一般可多至14片;小叶片下面幼时被星状细柔毛,但毛很快脱净变无毛。屏边鹅掌柴 *Schefflera pingpiensis* Tseng & Hoo 成熟小叶片下面虽然无毛,但幼嫩小叶片下面也有稀疏星状细柔毛,这就说明除了小叶数目较多外与本种没有什么明显差别,应合并入本种。

3. 多叶鹅掌柴 上思鸭脚木(广西植物名录)

Schefflera metcalfiana Merr. ex Li in *Sargentia* 2: 25. f. 2. 1942.

大灌木,高3—4米;小枝粗壮,幼时密生黄棕色星状短柔毛,后毛脱净。叶有小叶12—16;叶柄长13—22厘米,无毛;小叶片纸质至薄革质,卵形、卵状椭圆形至长圆状椭圆形,中央的较大,长7—9厘米,宽3.5—4.5厘米,两侧的较小,长3—5厘米,宽1—2厘米,有时很小呈苞片状,先端渐尖,基部楔形至阔楔形,上面有光泽,两面均无毛,边缘全缘或有疏离的锯齿2—4个,干时反卷,中脉仅下面隆起,侧脉5—7对,下面较明显,网脉上面稍下陷,下面不明显;小叶柄不等长,长1—4.5厘米,中央的较长,两侧的较短,无毛。圆锥花序顶生,长约30厘米,主轴和分枝有淡黄灰色星状短柔毛;花小;苞片及小苞片三角形,均疏生星状短柔毛;花梗长约4毫米,有星状短柔毛,不久毛渐变稀;萼长约1毫米,疏生星状短柔毛,边缘有5钝齿;花瓣5,三角形,长2—2.5毫米,无毛;雄蕊5,花丝长约1.5毫米;子房5室;花柱合生成柱状,长约0.6毫米;花盘扁平。花期10—11月。

产广西西南部。生于密林下。模式标本采自广西上思十万大山。

本种和海南鹅掌柴 *Schefflera hainanensis* Merr. & Chun 叶的小叶均可多至16,