

灌木或小乔木,高2—8米。叶有小叶12—14,稀7—8;叶柄长达50厘米,无毛;小叶片纸质至薄革质,椭圆状长圆形,稀倒卵状长圆形,长9—18厘米,宽3.5—5.5厘米,先端渐尖,基部阔楔形至近圆形,稍下延,上面无毛,下面疏生星状细柔毛或无毛,边缘全缘,侧脉8—15对,上面略明显,下面隆起,网脉疏散,上面不明显,下面略明显;小叶柄不等长,中央的长约7厘米,两侧的长0.5—2厘米。圆锥花序顶生,长40厘米以上,主轴和分枝均疏生星状细柔毛至几无毛;花长约3毫米;苞片小,长约1毫米;花梗长1.5—3毫米,扁平,疏生星状短柔毛;萼钟形,长1.5毫米,疏生星状短柔毛,边缘有5个三角形小齿;花瓣5,三角状卵形,长约2毫米,无毛;雄蕊5,比花瓣短;子房5室;花柱合生成柱状,长约1毫米。果实球形,有5稜,黑色,直径约4毫米;宿存花柱长约1.5毫米,柱头盘状,5小裂;花盘扁平。花期9月,果期11—12月。

产云南东南部。生于疏林中湿地,海拔1650米。模式标本采自云南屏边。

本种的原始记载,叶只有7小叶,但一般可多至14片;小叶片下面幼时被星状细柔毛,但毛很快脱净变无毛。屏边鹅掌柴 *Schefflera pingpiensis* Tseng & Hoo 成熟小叶片下面虽然无毛,但幼嫩小叶片下面也有稀疏星状细柔毛,这就说明除了小叶数目较多外与本种没有什么明显差别,应合并入本种。

3. 多叶鹅掌柴 上思鸭脚木(广西植物名录)

Schefflera metcalfiana Merr. ex Li in *Sargentia* 2: 25. f. 2. 1942.

大灌木,高3—4米;小枝粗壮,幼时密生黄棕色星状短柔毛,后毛脱净。叶有小叶12—16;叶柄长13—22厘米,无毛;小叶片纸质至薄革质,卵形、卵状椭圆形至长圆状椭圆形,中央的较大,长7—9厘米,宽3.5—4.5厘米,两侧的较小,长3—5厘米,宽1—2厘米,有时很小呈苞片状,先端渐尖,基部楔形至阔楔形,上面有光泽,两面均无毛,边缘全缘或有疏离的锯齿2—4个,干时反卷,中脉仅下面隆起,侧脉5—7对,下面较明显,网脉上面稍下陷,下面不明显;小叶柄不等长,长1—4.5厘米,中央的较长,两侧的较短,无毛。圆锥花序顶生,长约30厘米,主轴和分枝有淡黄灰色星状短柔毛;花小;苞片及小苞片三角形,均疏生星状短柔毛;花梗长约4毫米,有星状短柔毛,不久毛渐变稀;萼长约1毫米,疏生星状短柔毛,边缘有5钝齿;花瓣5,三角形,长2—2.5毫米,无毛;雄蕊5,花丝长约1.5毫米;子房5室;花柱合生成柱状,长约0.6毫米;花盘扁平。花期10—11月。

产广西西南部。生于密林下。模式标本采自广西上思十万大山。

本种和海南鹅掌柴 *Schefflera hainanensis* Merr. & Chun 叶的小叶均可多至16,

为本属中小叶数目最多的种类，它们的最好区别在于本种小叶片的网脉干时上面稍下陷。

4. 海南鹅掌柴(中国树木分类学)

Schefflera hainanensis Merr. & Chun, 中山大学农林植物所专刊 2: 295. t. 67. 1935; 陈嵘, 中国树木分类学 937. f. 831. 1: 37; Li in *Sargentia* 2: 25. 1942 — *Agalma hainanense* (Merr. & Chun) Hutch. Gen. Fl. Pl. 2: 622. 1967, syn. nov.

乔木或大灌木，高 4—10 米，胸径最大可达 25 厘米；小枝粗壮，被很快脱落的黄棕色星状绒毛；髓白色，薄片状。叶有小叶 14—16，有时其中 8—13 退化呈苞片状且被灰白色绒毛；叶柄长 10—30 厘米，无毛；小叶片纸质，卵形或长圆状卵形，长 4—12 厘米，宽 2—6 厘米，先端渐尖，基部阔楔形，略歪斜，上面深绿色，下面粉绿色，两面均无毛，侧脉纤细，7—10 对，上面明显，下面微隆起，网脉两面略明显，边缘全缘，干时反卷，多少呈浅波状；小叶柄不等长，中央的长 4.5—7 厘米，两侧的长 1.5—2 厘米，无毛。圆锥花序顶生，长约 30 厘米，主轴和分枝幼时密生星状短柔毛，成长后毛变稀；花小，有短柄，总状排列在分枝上；苞片小，密生星状短柔毛；萼倒圆锥形，密生星状短柔毛，结实后几无毛，边缘有 5 小齿；花瓣 5，长约 2 毫米，无毛；雄蕊 5，花丝比花瓣稍长；子房 5 室；花柱合生成柱状，长不及 1 毫米。果实近球形，有不明显 5 稜，直径 3—4 毫米；宿存花柱长约 1.5 毫米。花期 9 月，果期 10 月。

产广东(海南)。生于常绿阔叶林中，海拔 1300—1600 米。模式标本采自海南五指山。

李惠林在 *Sargentia* 2: 25. 1942 记载本种也分布于云南屏边，他举了蔡希陶 62779 号标本(幼嫩标本)。查中国科学院北京植物研究所保藏被定名为本种的蔡希陶 62799 号标本，花序虽幼小，但可以明显看出是伞形花序，此号标本应为短序鹅掌柴 *Schefflera bodinieri* (Lévl.) Rehd., 因为没有看到蔡希陶 62779 号标本，到底云南有无本种分布，尚待查究。

5. 西藏鹅掌柴

Schefflera wardii Marq. & Shaw in Journ. Linn. Soc. Bot. 48: 186. 1929; Li in *Sargentia* 2: 29. 1942 — *Agalma wardii* (Marq. & Shaw) Hutch. Gen. Fl. Pl. 2: 622. 1967, syn. nov.

灌木，高 2—3 米。叶有小叶 3—5；叶柄长 24—50 厘米，疏生星状绒毛或几无毛；小叶片薄革质，倒卵状长圆形或阔长圆形，长 15—33 厘米，宽 8—14 厘米，中央的