

较大,两侧的较小,先端突然渐尖,基部圆形或截形,上面无毛,下面疏生淡黄色或棕色星状绒毛,边缘疏生齿牙,齿尖直,彼此距离 0.5—1.5 厘米,中脉粗壮,仅在下面隆起,侧脉 8—13 对,网脉上面下陷,下面隆起;小叶柄长 3—7 厘米,无毛。圆锥花序顶生,主轴和纤细的分枝均密生星状绒毛;花小,长约 3 毫米,数十朵至 100 朵总状排列在分枝上;苞片三角状卵形,外面密生星状绒毛,花梗稍扁平,纤细,长 3—5 毫米,幼时密生星状绒毛,后毛渐脱稀;萼密生星状绒毛,萼筒长约 1.5 毫米;萼齿 5,三角形,长约 1 毫米;花瓣 5,三角形,长 1.5—2 毫米,外面有星状绒毛;雄蕊 5,花丝很短;子房 5 室;花柱合生成柱状,长不及 1 毫米;花盘扁平。花期 11 月。

产云南(怒江)和西藏(林芝、东久)。生于林下,海拔 2000—2500 米。模式标本采自西藏。

本种小叶片很大,下面被星状绒毛,圆锥花序很大,花瓣被毛等点,易与其他种类区别。

6. 瑞丽鹅掌柴

Schefflera shweliensis W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb. 10: 65. 1917; Li in Sargentia 2: 29. 1942 — *Agalma shweliense* (W. W. Smith) Hutch. Gen. Fl. Pl. 2: 622. 1967, syn. nov.

小乔木或灌木,高 7—10 米;小枝粗壮,无毛。叶有小叶 7—9,或 3—5,最多至 11;叶柄长 12—23 厘米,无毛;小叶片薄革质至革质,倒披针形,长 6—12 厘米,宽 1.5—3 厘米,先端渐尖,基部楔形,干时上面暗绿色,下面灰白色,两面均无毛,边缘全缘,侧脉 7—9 对,两面不明显,网脉几乎不明显;小叶柄短,长约 1 厘米,无毛。圆锥花序顶生,主轴和分枝幼时密生灰白色星状绒毛,老时脱净;花长约 4 毫米,单生或 2—3 朵聚生于分枝的苞腋内;花梗长约 3 毫米,有毛;小苞片三角形,长约 1.5 毫米;萼长约 2 毫米,幼时密生星状短柔毛,后变无毛;萼齿 7,三角形;花瓣 7,长三角形,长约 3 毫米,无毛;雄蕊 7,花丝长约 1.5 毫米;子房 5—6 室;花柱合生成柱状,长约 1 毫米,结实时长至 2 毫米,宿存;花盘扁平。果实球形,黑色,有不明显的 5 棱,直径约 5 毫米。花期 11 月,果期次年 1 月。

产云南西部(瑞丽、龙陵、镇康、景东)。生于常绿阔叶林林缘,也生于较干燥坡地,海拔 1900—2700 米。模式标本采自云南瑞丽。

本种花聚生成圆锥花序,小叶片倒披针形,小叶柄很短,容易识别。

7. 多脉鹅掌柴

Schefflera multinervia Li in Sargentia 2: 29. 1942 — *Agalma multiner-*