

小乔木,枝粗壮,无毛,叶痕明显;髓白色,薄片状。叶有小叶 5—9 (常为 7—9); 叶柄长 9—25 厘米,无毛,基部扩大抱茎;小叶片倒披针形、卵状长圆形至长圆状披针形,长 10—15 厘米,宽 2.5—5 厘米。先端渐尖,基部渐狭,上面有光泽,下面灰白色,两面均无毛,边缘全缘,侧脉 5—7 对;小叶柄长 1.5—3 厘米。圆锥花序顶生,长 20—30 厘米,下部的分枝较短,有小分枝成为复总状花序,上部的为总状花序,幼时有星状毛,但后来变无毛;苞片卵形,长 4—6 毫米;萼筒倒卵状陀螺形,有星状细毛,长 2 毫米;萼齿 6,不明显;花瓣 6,长三角形,长 2—2.5 毫米,外面稍有短柔毛,里面有隆起的中脉,顶端长尖;雄蕊 6,较花瓣稍长,花药圆形,药隔腺状;子房 6 室;花柱合生成柱状,长 0.5—0.8 毫米,柱头有不明显 6 小裂。果实球形,长 5—7 毫米,宿存花柱长 2 毫米。

产台湾。生于海拔 2000—2850 米的高山上。模式标本采自台湾阿里山。参考文献描述。

本种和产于印度及斯里兰卡的 *Schefflera racemosa* (Wight) Harms 相近,根据记载,不同在于本种小叶通常 8 片,花序主轴较长,基部的分枝较短,花通常 6 数。本种与产于云南的红河鹅掌柴 *Schefflera hoi* (Dunn) Vig. 极相似,从 Y. Kudo & S. Sazuki 在原模式标本产地(阿里山)采来的标本(中国科学院北京植物研究所标本室 81615 号),叶有小叶 6—8,小叶片狭长圆形或倒披针形,果实球形,宿存的花柱长约 2 毫米等特征,与红河鹅掌柴的枝叶及果实的特征相似,其花序(根据李惠林记载)每苞腋聚生花 2—6 朵,也与红河鹅掌柴的花序一样,所不同者仅在于本种花 6 数而已。因此,我们认为本种与红河鹅掌柴可能是同一种植物,由于见到的台湾标本不多,有待进一步考订。

组 2. 伞序鹅掌柴组——Sect. *Schefflera*——Sect. *Euschefflera* Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(8): 37. 1894, pro parte.

本组划分为以下 3 个亚组。

亚组 1. 无柱鹅掌柴亚组——Subsect. *Heptapleurum* (Gaertn.) Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1: 132. 1965——*Heptapleurum* Gaertn. Fruct. & Sem. 2: 472. 1791.

本亚组在我国有下列 8 种。

10. 细序鹅掌柴 图版 4: 8—9

Schefflera tenuis Li in Sargentia 2: 32. 1942.

灌木,高约3米;小枝纤细,无毛,干时有纵皱纹。叶有小叶3—5;叶柄纤细,长2—7厘米,无毛;小叶片纸质,倒卵状椭圆形或椭圆状披针形,长5—12厘米,宽0.7—3厘米,中央的较大,两侧的较小,先端尾状渐尖,尖头长2—2.5厘米,呈镰刀状,基部楔形,两面均无毛,边缘全缘,侧脉通常5对,网脉两面微隆起;小叶柄长0.5—2厘米,中央的比两侧的略长,无毛。花未见。圆锥花序顶生,疏散;分枝细弱,有极稀疏的星状绒毛至无毛,长7—9厘米,伞房状排列在极短的主轴上;伞形果序几个或十几个瓦生于分枝上,有果实2—5;总花梗长1.5厘米,无毛;苞片早落;果梗纤细,长5—6毫米,无毛。果实球形,橙红色,有红色腺点,5室,直径约4毫米;无花柱,柱头5个;花盘隆起,长为果实的1/5—1/6。果期6月。

产云南西北部,少见。生于山谷常绿阔叶林林缘,海拔约1700米。模式标本采自云南贡山。

本种和云南鹅掌柴 *Schefflera yunnanensis* Li 及广西鹅掌柴 *Schefflera kwangsiensis* Merr. 极近似,但其小叶片先端为尾状渐尖。

我国广州栽培的吕宋鹅掌柴 *Schefflera microphylla* Merr. 与本种区别在于小叶片披针形,宽仅4—6毫米,先端非镰刀状。原产菲律宾,供观赏用。

11. 云南鹅掌柴

Schefflera yunnanensis Li in *Sargentia* 2: 32. 1942.

藤状灌木,附生,长3—10米。叶有5小叶;叶柄长5—6厘米,无毛;小叶片革质,倒卵状长圆形或卵形,长5.5厘米,宽2.5—3厘米,先端渐尖,基部阔楔形至圆形,下面灰白色,两面均无毛,边缘全缘,侧脉5—6对,和网脉在两面均微隆起;小叶柄无毛,不等长,中央的长1.5厘米,两侧的最短,长仅2—3毫米,其余介在两者之间。花未见。圆锥果序顶生;分枝3—4,伞房状排列,疏生星状绒毛,有总状排列的伞形果序2—7;果序梗长7毫米,果梗长4—7毫米,均疏生星状绒毛。果实卵球形,有5棱,有腺点,连隆起的花盘长约4毫米,直径约2.5毫米;花盘圆锥状,长为果实的1/3;无花柱,柱头5。果期4月。

产云南西北部。生于沟谷湿地,海拔1300米。模式标本采自怒江和独龙江分水岭。

李惠林在原记载中描述:“小叶柄不等长,中央的长1.5厘米,侧生的较短,长2—3厘米”,侧生小叶柄长2—3厘米显然是印刷上的错误。

12. 广西鹅掌柴 广西鸭脚木(广西植物名录)

Schefflera kwangsiensis Merr. ex Li in *Sargentia* 2: 33. 1942.

灌木,高2米,有时攀援状;小枝干时有纵皱纹,无毛;节间短,长1—1.5厘米。叶

